

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
MUZ	Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.) Spiral nematod (<i>Helicotylenchus multicaucus</i>)	7,5 L/da	56 gün
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE	Turunçgil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	7,5 L/da	56 gün
TURUNÇGİL FIDANLIKLARINDA	Turunçgil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	5 L/da	---
TURUNÇGİL FIDANLIKLARINDA	Turunçgil nematodu (<i>Helicotylenchus semipenetrans</i>)	200 ml/100 L su (Bandırma)	---
DOMATES (Sera)	Domates kök ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	2,5 L/da	90 gün veya dikim öncesi

KULLANMA ŞEKLİ:

Ürünün Uygulamaya Hazırlanması:
Gerekli miktardaki ilaç biraz suyla ayrı bir kaptan önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar suyla doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşamüzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

Uygulama Zamanı:

Muz Bahçelerinde Kök ur nematodu: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tarımının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımasının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, **Storione EC** uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



STORIONE EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 400 g

Fenamiphos

Ethyl 4-methylthion-m-tolyl isopropylphosphoramidate

GRUBU	1B	NEMATİSİT
-------	----	-----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Dr. Kadir MELAN

Daire Başkanı

Hassan Tahsin

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79


Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T+:Çok Toksik N:Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T+: Çok Toksik N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Fenamiphos ve Solvesso 100 içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R24: Deri ile temas halinde, "zehirli olma riski" tasır.

R28: Yutulması halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" tasır.

R38: Cildi tahriş eder.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21: Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S23: Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın.

S24/25:Cilt ve göz ile temasından kaçının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın

S29: Kanalizasyona boşaltmayın

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tic. Sic. No: 270000

Hassan Tahsin

0232 864 16 79

23 Ocak 2014

Turunçgil Bahçelerde Turunçgil nematodu: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbahar'da yapılmalıdır.

Turunçgil Fidanlıkları Turunçgil nematodu: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken hazırlanan ilaçı suya 30 dakika süre ile bandırılır.

Domatesde Kök ur nematodu: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavator veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Storione EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematostittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Storione EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

23 Ocak 2014

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



STORIONE EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 400 g Fenamiphos

Ethyl 4-methylthion-m-tolyl isopropylphosphoramidate

GRUBU	1B	NEMATİSİT
-------	----	-----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı, göz bebeklerinin büzülmesi, nefes almada zorluklar ve terleme

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hasta ilaçlama sahasından uzaklaştırılır. İlaçla temas eden vücut kısmı bol su ve sabunla yıkanır. Doktor çağrılır. Bitki koruma ürünü ile ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

2 mg Atropin damara zerk edilir. Şiddetli zehirlenmelerde doza 4 mg'a çıkarılır. 10-15 dakikada bir hasta iyileşinceye kadar 2 mg olarak tekrarlanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Dr. Kadir MELAN
Daire Başkanı
F. Melan

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56:Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürününi koymayınız.

*Arlara, kuşlara zehirlidir

*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.

*İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orjinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orjinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbalı / İZMİR / TÜRKİYE

211 Ak