

İmza Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

Buğdayda dar yapraklı yabancıot mücadelesinde kullanılan yabancıot ilacı.

Etki Şekli:

Reward Max dar yapraklı yabancıotların yapraklarından alınır. İlaça hassas dar yapraklı yabancıotlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.

Uygulanmadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY	Yabani yulaf=Şifanak (<i>Avena sverillis</i> , <i>A. fatua</i>)	
	Kuş yemi=Kanlıcaayır (<i>Phalaris minor</i> , <i>P. paradoxa</i> , <i>P. branchystachys</i>)	Dekara 20 ml dozda; tercihen buğdayın erken kardışlenme devresinde; en geç kardışlenme sonuna kadar kullanılır.
	Tilki kuyruğu=Su otu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
	Delice (<i>Lolium temulentum</i>)	

Bitki Tahammülü:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Münavebe Esnekliği:

Reward Max toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadardır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L Şti.



REWARD MAX

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 240 g/L
Clodinafop-propargyl =prop-2-nyyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy] propionate +
60 g/L Cloquintocet-mexyl (safener)=1-methylhexyl(5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate

GRUBU	A,-	HERBİSİT
-------	-----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

31 Mart 2013

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL ERLERİ



Devamı 2. sayfa

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

Clodinafop-propargyl+ (Cloquintocet-mexyl) içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda Basınçlı su, CO2, yangın söndürme tozu, köpük, kum kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 883 3333

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31

Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 075 8604

KULLANMA ŞEKLİ:**İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:**

Traktör ile çekilen pülverizatör: Aletin deposunu, 1/3 ila 1/2 seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz. Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaça mahlule ilave ediniz. İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

Uygulama:

Reward Max orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme (Püskürtme açısı: 110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaça mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

Uygulama Zamanı:

Reward Max, buğday ve yabanciotlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. **Reward Max**'dan en iyi sonuç; yabanciotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ilik, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdüğü devrede uygulandığında elde edilir. **Reward Max**'nin kalıcı etkisi olmadıktan sonra, ilaça uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabanciotlar kontrol edilmelidir.

ilaçlamamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Reward Max adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A₁- olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Reward Max**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A₁- hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabanciotların yanı sıra geniş yapraklı yabanciotlar da kontrol edilmek istendiğinde **Reward Max**; triasulfuron+terbutryn ile karışım halinde kullanılabilir. **Reward Max** , silfonyl urea ve 2,4-D terkibli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır. **Reward Max** buğday fungusitleri ile birlikte kullanılabilir.

**REWARD MAX**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 240 g/L

Clodinafop-propargyl –prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy] propionate + 60 g/L Cloquintocet-mexyl (safener)-1-methylhexyl(5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate

GRUBU	A ₁ -	HERBİSİT
-------	------------------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenmeden şüpheleniyorsa derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız. Cilt veya gözlerin ilaça teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Gözlere bulaşan ilacı bol temiz su ile asgari 10 dakika yıkayarak temizleyiniz. İlacın tenefüs edilmesi halinde temiz havaya çıkarınız. Ağız yoluyla alınması durumunda bol su ile tıbbi kömür veriniz. Konsantre ilacın ağız yoluyla çok miktarda alınması halinde ise tıbbi yardım istenir.

Not: Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

31 Mart 2013

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114
GIDA VE TARIM BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜRÜRLÜKTE

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Gıda ve yemleri ilaça bulaştırmayınız.
- *İlaçlama aletlerini ve koruyucu ekipmanı temiz suyla yıkayınız.
- *İlaçlama aletlerini iyice süzdürerek boşaltınız.
- *Temiz su ile aletin deposunu, ilaçlama çubuğunu ve memeleri 2-3 defa çalkalayınız.
- *İlaçlı mahlülü ihtiyacı kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaça mahlülü on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz.
- *Yıkama suyunu nadas araziye döktünüz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalaçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalaçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar
Torbali /İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 075 8604