


İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ZEYTİN	İ halkalı leke hastalığı (<i>Spilocaea oleagina</i>) <i>Cyclocotium oleginum</i>)	1. ilaçlama: 1.500 g / 100 L su 2. ilaçlama: 1.000 g / 100 L su	14 gün
BAĞ	Milidiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	1. ilaçlama: 700 g / 100 L su 2. ilaçlama: 1.000 g / 100 L su 3. ilaçlama: 1.300 g / 100 L su	14 gün
	Ötü kol (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g / 100 L su Kış ilaçlaması 500 g / 100 L su Yaz ilaçlaması	14 gün
	Yaprak kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g / 100 L su	14 gün
ELMA	Kara leke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g / 100 L su	14 gün
KAYISI	Yaprak delen (<i>Corynetum betjerinkii</i>)	Normal dönem 625 g / 100 L su Dormant dönem 1.250 g / 100 L su	14 gün
	Milidiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 g/da veya 600 g/100 L su	14 gün



GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR SAĞLAMAYA

09 Ekim 2014

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



CENTUREX

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miltarı:
% 20 Metalik bakır (Bordo Bulamacı)
Kalsiyum hidroksit ve Bakır (II) Sülfat

GRUBU	MI	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIKASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ: Xi: Tahriş edici N: Çevre için zararlı
TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: TAHRİŞ EDİCİ

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

% 20 Metalik bakır (Bordo Bulamacı)
Kalsiyum hidroksit ve Bakır (II) Sülfat

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

- R41: Gözde ciddi hasar riski.
- R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.
- R53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
- S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
- S25: Gözle temasından kaçının.
- S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- S29: Kanalizasyona boşaltmayın.
- S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 445 660076 Sic No:3749

KULLANMA ŞEKLİ:**İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:**

Bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bulamaç haline getirilmelidir. İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su, sonra hazırlanan bulamaç konulmalı ve aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile doldurulmalıdır.

İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzlerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havada yapılmalıdır.

*** Zeytin İlaçlama Zamanları:****Marmara Bölgesinde:**

1. ilaçlama: Ekim ayının ilk yarısında
2. ilaçlama: Nisan ayının ilk yarısında

Ege Bölgesinde:

1. ilaçlama: Zeytinde sürgün vermeden önce Şubat ayında
2. ilaçlama: Zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında

Akdeniz Bölgesinde:

1. ilaçlama: Kasım veya Aralık ayında
2. ilaçlama: Mart ayının ilk yarısında
3. ilaçlama: Nisan ayının ilk yarısında

Bağda ilaçlama zamanları:

Müddet: Sürgünler 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 10-14 gün aralıklarla tekrarlanır.

Öhükol: Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönemde yapılır.

- Yaz uygulaması: 1. ilaçlama, sürgünler 2-3 cm boyda iken;
2. ilaçlama, sürgünler 8-10 cm boyda iken.
3. ilaçlama, sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Şeftalide ilaçlama zamanı: şeftali yaprak kıvrıcılığında çiçek gözleri kabarmak üzereyken kullanılır.

Elmada ilaçlama zamanı: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Kayısıda ilaçlama zamanları: Dormant dönem uygulaması, sonbaharda yapraklar döküldükten hemen sonra yapılır. Normal dönem uygulamalarından 1.si ilkbaharda çiçek tomurcuğunun kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce; 2.si ise, meyvelerde çanak yaprak ve etek organ tablası meyvenin ucunu sıyrınken yapılır.

Domateste ilaçlama zamanı: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce veya hava koşulları hastalık çıkışına uygun olduğunda ilaçlamaya başlanır.



CENTUREX

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

% 20 Metalik bakır (Bordo Bulamacı)

Kalsiyum hidroksit ve Bakır (II) Sülfat

GRUBU	MI	FUNGİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızda maddenin bir tat, kanlı ishal, mavi-yeşil renkli kusma, hızlı solunma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulamık görme, fazla miktarda alındığında (5-8g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıka. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptır. Ağız yolu ile alınmış ise hastayı doktor kontrolünde kustur. Doktor çağır, ilaç ambalaj ve etkisini birlikte götür.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur, aktif kömür ile mide yıkanır. Dolaşıma yardım maksadıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

09 Ekim 2014

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:


AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Forball-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Çiftliği/İzmir (110 3)

Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin V.D.



DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Centurex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Centurex'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ilaçlarla (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicileri v.s.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lfd. Şti.

AGRI
SCIENCES

CENTUREX

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:
% 20 Metalik bakır (Bordo Bulamacı)
Kalsiyum hidroksit ve Bakır (II) Sülfat

GRUBU	M1	FUNGİSİT
-------	----	----------


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. Ş.İ.
Bekir Saydam Cad. Dışkapı No 31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D.



AGRI TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
AGDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR EKİBİNDİR

09 Ekim 2014