

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şağ No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON KULLANMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Kabakgiller	Yabancı miltidyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	50 g/ 100 L su	3 gün
Bağ	Miltidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	60 g/100 L su	7 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

Uyulanmaya Hazırlama Şekli:
İlaçlama aletin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Aynı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilen ilaç depoya konur. Mekanik ya da hidrolik karıştırıcılarla karıştırılır ve geri kalan su miktarı depoya ilave edilir.

İlaçlama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama havanın serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır.
Kabakgillerde Miltidyö'ye karşı: Uyulanmaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk miltidyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 5 gün ara ile en az iki ilaçlama yapılır.
Bağda Miltidyö'ye karşı: Birinci ilaçlama sürgünlere 25-30 cm boyunda iken yapılmalıdır. İkinci ve üçüncü ilaçlamalar ilacın etki stresi dikkate alınarak 12 gün aryla uygulanmalıdır. Şayet meteorolojik şartlar hastalığın çıkışına uygun gider ve ilaçlamanın devamına gerek duyulursa 4. ve 5. ilaçlamalar da yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ: Caspertin adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup-27olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Caspertin 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup-27 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

CASPERTIN

İslanabilir Toz (WP)

Aktif Madde Adı ve Miktarı: % 50 Cymoxanil
1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

GRUBU 27 FUNGISİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VEVEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve terleme

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktor çağır, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götür. Temas halinde deriyi sabunla yıkayın. Yutulursa kusturun, teneffüs edilmişse hastayı derhal bulaşık sahanadan uzaklaştırın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

01 Mart 2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DEVAMIZ. SAYFADA

A. H. Kar



Net Miktar:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn: ZARARLI İÇİNDEKİLER:

Cymoxanil içerir.

RISK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R43: Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.

R 50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R 53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2:Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S22: Tozlarını solumayın.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S29: Kanalizasyona boşatmayın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No: 31,

Pancar ,Torbali – İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜP. SAN. VE TİC. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No: 31,

Pancar, Torbali - İzmir

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

Torbali V.D. 908 075 8604

