

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PATLİCAN	Beyaz sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml/da larva, pupa	3 gün
PAMUK	Beyaz sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml/da larva, pupa	28 gün
BİBER (Sera)	Beyaz sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml/100 L su larva, pupa	3 gün
DOMATES (Sera)	Beyaz sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml/100L su larva, pupa	1 gün
ŞEFTALİ	Dut kabuklubiti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	50 ml/100L su larva	14 gün

#### ÖZELLİKLERİ:

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. İlaçlanmış bitkilerde bulunan ya da sonradan konan yumurtalar açılmaz. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değişimine sırasında ölürler.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlaç Uygulamaya Hazırlanması:**  
Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

**Uygulama Şekli:**  
İlaçlama sabah öğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle püskürtülebilir.

**Beyaz sinekte:** Yapıakta 5 adet Beyaz sinek larvası görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

**Dut kabuklubitinde:** Birinci ve ikinci döle karşı ilaçlamalar ilk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra yapılır.

11 Eylül 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
ÇEŞME VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
LABORATUVAR BAŞKANLIĞI

*(Signature)*

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd



## INTRACURE

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 100 g/L Pyriproxyfen  
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) Tc:114



Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı N:Çevre için tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ



Xn: Zararlı

**İÇİNDEKİLER**  
PYRIPROXYFEN VE KSİLEN İÇERİR.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

R10 : Alevlenir.

R20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararıdır.

R38 : Cildi tahriş eder.

R51/53 : Suel organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S43: Alevlenmesi durumunda köpük, karbondioksit, yangın söndürme tozu kullanınız.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**  
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Talatın VD 008-079 8604 00 Sic No 3741

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Intracure adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Intracure'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 7C hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:**

Alkali özellikteki diğer yağm fungusit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd.

**INTRACURE**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 100 g/L Pyriproxyfen  
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Mide bulantısı, kusma, ishal

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

İlaçla bulaşık elbiseler çıkartılır ve deri bol su ile yıkanır. Göze kaçması halinde bol su ile yıkanır. İlaç yutulmuşsa, derhal doktor çağırın. Yutuluyorsa hastaya yudum yudum 1 bardak su içirin. Doktor söylememişse hastayı kusturmayın. Bilinci yerinde değilse, hastaya ağzından bir şey vermeyin.

**ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tet:114

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama . bertaraf edin / ettirin.

S57: Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bitinci yerinde ise).

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

\*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

\*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

\*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

\*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. \*Balkıklar için zehirlidir.

\*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

\*Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**


İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

11 Eylül 2014

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 0232 864 13 33 Tic Sic No 374