

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

Metarex "dimethomorf" ve "mancozeb" etkili maddelerini ihtiva eden, yüksek penetrasyon (yaprak dokulama nüfuz etme) özelliği olan, lokal sistemik, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip çift etkili bir fungisittir.

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HİYAR	Milidyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
BAĞ	Bağ milidyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g/100 L su	28 gün
SOĞAN	Soğan milidyözü (<i>Peronospora destructor</i>)	200 g/100 L su	7 gün
PATATES	Patates milidyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/da	7 gün
DOMATES	Domates milidyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/100 L su	7 gün


KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile ayrı bir kaptan bulamaç haline getirilerek yarıya kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır. Daha sonra tank suyla tamamlanır.

Uygulama Zamanı:

Hyarda Milidyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk milidyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün ara ile yapılır.

Devamı 2. sayfada



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Islanabilir toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

%9 Dimethomorf+%60 Mancozeb
[(E-Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3-4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine] + [manganese ethylenebis(dithiocarbamate)](polymeric)complex with zinc salt]

GRUBU	40, F5-M3	FUNGİSİT
-------	-----------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖKTE BİRNE KADAR TEMİZ SU Koyarak İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

15 Nisan 2013

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114
GIDA TARIM VE HAYVANCIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli



TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Dimethomorf ve Mancozeb içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R37: Solunum sistemini tahriş eder.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. (Repr. Cat. 3)

R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsin

Bağda Mildiyö: İlaçlama sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olduğunda uygulanmalı. 2. ve daha sonraki ilaçlamalar için 1. ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınmalıdır.

Meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığı anda ilaçlamalara son verilmelidir.

Sogun mildiyösi: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hava koşulları ve bitkinin gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Patates mildiyösi: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16°C veya en düşük sıcaklığın 10°C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.

Hastalığın her yıl görülmeyişi alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havalarm kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Domates mildiyösi: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Metarex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 40,F5-M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Metarex'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 40,F5-M3 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



METAREX

Suda islanabilir toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %9

Dimethiomorf+%60 Mancozeb

[(E-Z)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3-4-

dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine] + [manganese ethylenebis(dithiocarbamate)(polymeric)complex with zinc salt]

GRUBU	40,F5-M3	FUNGİSİT
-------	----------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz, cilt ve mukozada kaşıntı ve tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaç yutulmuş ise hastaya 1-2 bardak su içirilir kusturulmalıdır. Hasta baygın durumda ise kusturulmaz ve hiçbir şey verilmenden hastaneye kaldırılmalıdır. İlaç göz veya vücutta temas etmiş ise bol ve temiz su ile iyice yıkanmalıdır. Solunum yolu ile etkilenmelerde, hasta temiz havaya çıkarılmalıdır.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

15 Nisan 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan grıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak grdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmaması orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. / Pancar / Torbali / İzmir

Tic Sic No: 20030758604

Hasan Tahsin V.D. 0030758604