

İmza Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şaflı No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	10 ml/100 L su	14 gün
ARMUT	Karaleke ( <i>Venturia pyrina</i> )	10 ml/100 L su	14 gün
ŞEKER PANCARI	Yaprak leke hastalığı ( <i>Cercospora beticola</i> )	30 ml/da	14 gün
	Külleme ( <i>Erysiphe betae</i> )	20 ml/da	

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlacın Uygulamaya Hazırlanması:**  
Gerekli miktar ilacı az miktar su ile ayrı bir kaptan bulamaç haline getiriniz. İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurunuz ve aletin karıştırıcısını çalıştırarak ilacı ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Uygulama esnasında karıştırma aparatı çalışır durumda olmalıdır.

#### Kullanma Zamanı:

İlaçlama meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak, ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.

#### Elmada Karaleke:

- İlaçlama: Tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında),
- İlaçlama: Pembe tomurcuk devresi (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
- İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %70-80 i döküldüğünde,
- ve diğer ilaçlamalar: Hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.

#### Armutta Karaleke:

- İlaçlama: Çiçek tomurcukları patlamak üzere iken,
- İlaçlama: Beyaz rozet devresinde,
- İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90'ı döküldüğünde,
- ve diğer ilaçlamalar: 3. İlaçlamadan sonra havalar yağışlı girdiğinde, yağışlı girderse 12-13 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama (sarımsı yağış ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır).

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lt. Şti.



# KNOXBORO

Emülsiyon konsantre (EC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 250 g  
Difenoconazole  
cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

GRUBU	3	FUNGİSİT
-------	---	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

0 4 Eylül 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



Ahmet KAVAK

Genel Müdür Yardımcısı

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI

TEHLİKE SEMBOLLERİ



Xn: ZARARLI  
İÇİNDEKİLER:

DIFENOCONAZOLE, M-PYROL VE SOLVESSO 100 İÇERİR.  
UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda Basınçlı su, CO2, yangın söndürme tozu, köpük, kum kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 18 33

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar, Torbalı /İZMİR

Hasan Tahsin V.İ. 009 075 8604

**Şeker pancarında Yaprak leke hastalığı:**  
Yaprakların %5'inde birer Cercospora lekeli görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.


**Şeker pancarında Külleme:**  
İlk külleme belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Knoxboro adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Knoxboro'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 3 hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullandığı ilaçlardan etkilenmez. Gerekli görülmesi halinde bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.



Ahmet KAVAK  
Genel Müdür Yardımcısı

SA  
SP  
JMN



## KNOXBORO

Emülsiyon konsantre (EC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 250 g

Difenocoazole  
cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

GRUBU	3	FUNGİSİT
-------	---	----------

#### **KULLANICININ EMNİYETİ:**

Yemeden içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakın, ilk yardım tedbirlerini alın. İş bittikten sonra koruyucu ekipmanı iyice temizleyin, vücudun ilaca maruz kalan kısımlarını yıkayın sonra günlük elbiselerinizi giyin.

#### **ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

#### **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Muhtemel olmamakla birlikte şayet zehirlenmeden şüpheleniliyor ise derhal işi bırakın ve doktor çağırın. Hastanın ilaça daha fazla temasını kesiniz. İlaça bulaşık elbiseleri çıkarın, hastayı sabunlu su ile iyice yıkayınız. Hastayı iyi havalandırılan bir yere alınız. Şayet ilaç yutulmuş ise bol miktarda aktif kömür veriniz.

#### **ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

04 Eylül 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

#### **KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürününtü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Bahıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### **DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

#### **FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### **RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31  
Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsin V.R. 005 075 8604