


İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
TURUNÇGİL	Kırmızı örümcek (<i>Panonychus citri</i>)	20 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin	14 gün
	Pas böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	20 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin	
ELMA	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin	14 gün
	Ak diken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100 L su yumurta, nimf, ergin	
KİRAZ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su nimf, ergin	14 gün
BAĞ	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su nimf, ergin	14gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.



Devamı 2. sayfada.

AGRI SCIENCES Tarm ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L. Şti.



LISTOMED

Süspansiyon Konsantr (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Spirodiclofen
3-(2,4-dichlorophenyl) [4,5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

GRUBU	23	AKARİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI STRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 4 SAAT SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

08 Şubat 2013

YARIM ve HAYVANCIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı (kanserojen, kat. 3), N: Çevre için tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ



N:Çevre için tehlikeli

Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER:

Spirodiclofen İçerir:

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R43: Cilt ile temastan hassasiyet oluşturabilir.

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarm ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin 008 075 8604

2. sayfa

Uygulama Zamanı:

Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey (nimf, ergin) görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır. Bağda yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır

DAYANIKLILIK DURUMU:

Listomed bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda 1 defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Listomed adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Listomed' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıncı yapıstırcı karıştırılmasına gerek yoktur.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



LISTOMED

Süspansiyon, Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Spirodiclofen
3-(2,4-dichlorophenyl) [4-5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

GRUBU	23	AKARİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsanlarda belirgin bir zehirlenme belirtisi saptanmamıştır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ VE ANTİDOTU:

Yutulmuşsa derhal doktor çağırılmalı, hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır. Deriye temas olursa bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaçla bulaşık giysiler çıkarılmalıdır. Göze bulaşmışsa bol suyla yıkayın, göz doktoruna görünün. Hastanın bilinci yerinde değilse yan pozisyona getirin ve bu şekilde taşıyın.


ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

08 Şubat 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Dr. Neval BİRİŞİK
Genel Müdür Yardımcısı

KULLANIRKEN VE DEPOLARIKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve iyecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir.
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
- *Balkıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalar dan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsin 068 075 8604