

THIRA FORT 80 WP

FUNGİSİT (Manzar-İlac)

İstenenbilir Toz WP

%80 Thiram

Tetrametilyliüram disüfidi

Sıçanlara akut ağrıdan LD₅₀: 2600 mg/kg**DİKKAT**

TANSIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLA ESNASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMENİZ VE İÇMEYİNİZ.

SİĞARA İÇMEYİNİZ.

İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMEYİNİZ

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlaç dozları deni ile temas ettiğinde erythema yapabilir.

İLYARDIM TEDBİRLERİ:

İlaçla temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayınız. İlaç yutulmuş ise hastayı kusturunuz. Doktora başvurunuz. İlaç ambalajı ve etiketini biriktirey tutun.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİRLENME MERKEZİ: (UZEM:114)

Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

Net Miktarı:

Brüt Ağırlığı:

Paketlerde satış fiyatı (K.d.v. Dahil):

Tarım ve Köy İşleri

Beklenilgi yazısının

tarihi ve no'su:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Balıklar ve suda yaşayan canlılara zararlıdır. Sulara bulaştırmayınız

Kendi ambalajları fışide kapalı ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

İlaçlamaya koruyucu olarak başlatmalı ve bitkiler kaplıbana

olarak ilaçlamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU : Normal (serin ve kuru) şartlarda

orijinal ambalajında ağırlımadan depolanırdında 2 yıl süre ile

ilaçın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşşöbü

(tolerans) sınırları dışında bir değışiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

İlaçın kullanımını bizim kontrolümüz dışında olduğından, hatalı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Caddesi No:31

Pancar Beldesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0 232 864 13 33 Fax : 0 232 864 16 79

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Şarj No :

Ruhsat Tarihi ve No.su :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	Hastalık adı	Kullanma Dozu ve Dönemi (gün)	Son İlaçlama ile hesap aralırdındaki süre (gün)
Şeftali	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>) Yaprak deleni (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	300 g /100 L su 300 g /100 L su	14 14
Kayısı	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	200 g /100 L su	14
Elma	Karatelke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g /100 L su	14
Armut	Karatelke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g /100 L su	14
Erik	Çap hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g /100 L su	14
Kiraz	Monilya (<i>Sclerotinia laxa</i>)	150 g /100 L su	14
Soğan	Stimme (<i>Urocystis cepulae</i>)	5 kg/100 kg arpacık 300 g/100 kg tohum	— —
Nohut	Antraknoz (<i>Ascochyta rabiei</i>)	200 g/100 L su (yeşil aksam ilaçlaması)	14
Sebzeler	Kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia spp.</i>) (<i>Pythium spp.</i>), (<i>Fusarium spp.</i>) (<i>Sclerotinia spp.</i>), (<i>Alternaria spp.</i>)	200 g /100 kg tohum	—
Kavun	Antraknoz (<i>Colletotrichum lagenarium</i>)	300 g /100 kg tohum	—
Karpuz	Kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i>) Macrophomina phaseoli, <i>Rhizoctonia spp.</i>	300 g /100 L su	14
Fasulye	Fındık Fasesi (<i>Mycaradimus spp.</i>) Yediyur (<i>Sitiz glis</i>) (Kazıcı rapelant olarak)	4 kg / 100 L su	14
Fındık	Tarla tavşanı (<i>Lepus europaeus</i>) Ada tavşanı (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	150 g /1 L su 200 g/100 L su veya 2,5-3 g /m ²	—
Tütün (Fidelikte)	Çökerten (<i>Damping-off</i>)	400 g /100 kg tohumu	14
Şeker Pancarı	Kök boğazı yanıklığı (<i>Phoma betulae</i>)	400 g /100 L su veya 2,5-3 g/m ²	—

İLACIN HAZIRLANIŞI: İlaçlama aletinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Aynı bir kapla ön karışım haline getirilen ilaç aletinin deposuna aktarılır. Daha sonra aletinin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

KULLANMA VE ETKİ ŞEKLİ:

Kontak olarak etki eder. Hastalık etmenlerinin sporlarının çimlenmesini engel olur.

Etma ve Armutta: Karatelke hastalığına karşı çiçek gözleri tabağı zaman ilk ilaçlama pembe gonca (etma), beyaz rozet (erim) devresi ikinci ilaçlama, çiçek ve toz yapraklarının %70 - 80 i okültüğünde üçüncü ilaçlama yapılır ve hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

Şeftali Kayısıda: Monilya 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%80 -100 çiçekte) ilen yapılır.

Erik cepi: Hastalığı 1. ilaçlama tohumculuk tabağı dönemi 2. ilaçlama çiçek toz yapraklarının %80'inin okültüğü döneminde yapılmalıdır.

Nohutta: Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süre ile su içerisinde ısıtıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir.


Tarla ve ada tavşanına karşı: İlan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metro yüksekliğe kadar olan kısımları ilanıncaya kadar ilaçlanır.

Fındık fasulinesine karşı: İndikların etki ölümü devresinden itibaren zararazar görüldür görüldür ilaçlamaya başlanır.

Tütün Fidelelerinin çikası tamamlandıktan sonra: Hastalık görüldüğünde (damping off) 200 g/100 L su veya 2,5-3 g/m² uygulanır.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

Ekonomi, Carbocin ve Triadimenol içeriği ilaçlarla karışabilir. Bakteri fungusülerle karıştırmaz. Biyolojik bakterin ilaç uygulamasına hemen ardından THIRA FORT 80 WP tabakalı yapılmalıdır. Bakteri ilaç tabakı uygulanırsa, aradan 48 saatlik bir süre için geçmesi beklenmelidir.



Yokarıca A.İ.M.Ş.
AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No. 31
Torbalı / İZMİR

Torbalı V.D: 008 075 8604