

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şaşı No:
Ruhsat Tarihi ve No.su:



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Meyve, Bağ, Turuncgiller, Fındık, Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar	Tek yıllık yabancı otlar: Yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Yabancı havuç (<i>Dactis carota</i>) Kısr brom (<i>Bromus sterilis</i>) Kuş yemi (<i>Phalaris</i> spp.) Çimenisi müdümlük (<i>Lathyrus nissolia</i>) Balıhbaba (<i>Lamium</i> spp.) Kanarya otu (<i>Senecio vernalis</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yer festiğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Çukurova hardal (<i>Cochliodon agropyriacum</i>) Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Turna gagası (<i>Cerastium dissect</i>) Yabancı fiğ (<i>Vicia</i> spp.) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Ebegüncesi (<i>Melva parviflora</i>) Yabancı yonca (<i>Medicago</i> spp.) Senez otu (<i>Poirulaca oleracea</i>) Sütüğü (<i>Euphorbia</i> spp.) Sirkon (<i>Chenopodium album</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) Tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kırpi dar (<i>Yapşkan otu</i>) (<i>Setaria viridis</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli dancan (<i>Echinochloa colonum</i>) Horoz toğu (<i>Amaranthus albus</i>) Yeşil horoz toğu (<i>Amaranthus viridis</i>) Yabancı otlar: Çok yıllık yabancı otlar: Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Köpek dişi ayığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarda saması (<i>Convolvulus arvensis</i>) İsngan otu (<i>Urtica dioica</i>) Pelin otu (<i>Achillea millefolium</i>) Karıyaş (<i>Sorghum halapense</i>)	300 ml/da Yabancı otları genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Kara, Demir yolu Kenarları, Havaneler, Fabr. Bahçeleri, Tarihi Alanlar, Tarım Kenarları	Çalmsı ve adamsı bitkilere karşı	1000 ml/da Aktif büyüme devresinde
Banketler, Sis ve Drenaj Kanalları	Banket ve sis tisi yabancı otlar	1000-1500 ml/da Aktif büyüme devresinde

TARIM VE KOYUŞLARI BAKANLIĞI
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19/11/2011

devamı 2. sayıfada

Net Miktar:
Brüt Ağırlığı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
- * İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- * Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Uşultıne uygun olarak ilacı inha etmeyiniz.
- * Çiğnek ve galvanizli kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız.
- * Anıları, kuşlara ve balıklara zehirli değildir.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı olarak gıdalardan uzak çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneşe maruz kalmayan ayrı bir bölüme kilitli alanda depolanmalıdır. Normal depolanma şartlarında depolandığı taktirde fiziksel, kimyevi ve biyolojik özelliklerinde en az iki yıl değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Agri Sciences bu ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla etiketdeki kimyevi maddeye uygunluğunu garanti eder. Kullanıcı, firmanın kontrolü dışındaki faktörlerden doğabilecek zarar riskine kadir. Firma ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya hatalı kullanımından kaynaklanan zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No: 31,
Pancar, Torbalı - İZMİR
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No: 31, Pancar, Torbalı - İZMİR

Torbalı

İLACIN TİCARİ ADI

EPOSTAR 480 SL

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Sulu Solüsyon (SL)

Etkili madde ve miktarı: Liride 480 g Ciyphosate isopropylamın uzat N-(Phosphonometil) gliyene

Siçanlarda akut oral LD₅₀ > 5000 mg/kg

ZEHIRLİ

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.

İLAÇ BURUNUNU VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLAMA SIRASINDA HIÇ BİRŞEY YEMEYİNİZ.

SİĞARA İÇMEYİNİZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün. İlaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı ilaça maruz kalmasından hemen uzaklaştırın. İstirahat ettirin. İlaç ile buluşmuş elbiselerini çıkarın. Hastayı, kendinde ise kusturun. Solunum yavaşlarsa suni solunum yapın. Hastayı başını vana döndürerek vaktini ve sıcak tutun.

ANTİDÖTÜ: Özel bir antidot yoktur.
TEDA: Vücutta gereği kadarını kullanın.
Genel Müdahale Yabancı

ULUSAL ZEHİRLİ BİTKİLERİ BAKANLIĞI MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



2. sayfa

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurularak ilaç karışım ilave edilir, iyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pülverize edilir.

KULLANMA ŞEKLİ: İlaç mahlûlün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir.

Epostar 480 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litre dir. Uygulamalarda örneğin yeşil pazıye lüzmeit menne kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmaz. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdüğü zaman elde edilir.

KARİŞİBİLİRLİĞİ: Diğer bazı herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Ancak bu konuda üretici ve satıcı firmaya danışılması tavsiye olunur.



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İLACIN TİCARİ ADI

EPOSTAR 480 SL

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Sulu Solüsyon (SL)

Etkili madde ve miktarı: Liride-480 g Cyphosate isopropylamin tuzu
N-(Phosphonometil) glycine

Sıçanlarda akut oral LD50 > 5000 mg/kg

ZEHİRLİ

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HIÇ BİRŞEY YEMİYİNİZ,
SİĞARA İÇMEYİNİZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Dr. Yücel ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

**TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.**

05 Mayıs 2011

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No: 31,
Pancar ,Torbalı – İZMİR
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbalı / İzmir
Tic. Sic. No: 270880
Sic. No: 8604