

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAK İBİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Kara leke (<i>Venturia inaequalis</i>) Külleme (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	30 g/100 l su 40 g/100 l su	7 gün 14 gün
ARMUT	Kara leke (<i>Venturia pirina</i>)	30 g/100 l su	7 gün
AYVA	Monilya (<i>Sclerotinia linharitana</i>)	50 g/100 l su	14 gün
ANTEPFİSTİĞİ	Karazenk (<i>Septoria pistacina</i>)	50 g/100 l su	-
NAR	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata</i>)	50 g/100 l su	-

KULLANMA ŞEKLİ:


İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

Uygulama Zamanı:

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translinar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungisitir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM'e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

Elma ve armutta Karaleke:

- ilaçlama: Çiçek gözleri kabadığı dönemde
- ilaçlama: Elmada pembe ve armutta beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde
- ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde
- ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesini önlediği durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.



Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Dağılabilen Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:
% 25,2 Boscalid+%12,8 Pyraclostrobin
2-chloro-N-(4-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide+
methyl-N-{2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate

GRUBU	C2,7+C3,11	FUNGİSİT
-------	------------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBOLÜ VE AÇIKLAMASI:



Xn: Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:
PYROCLOSTROBİN VE BOSCALİD İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R23 : Solunması halinde toksiktir.

R50 : Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53 : Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21: Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S38: Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun. (mümkünse etiketi gösterin).

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S63: Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:45

Torbalı-İZMİR

Tic. Sic. No: 3749

Dr. Alanur HAS

Elmada Külleme:

- 1.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
- 2.ilaçlama:Çiçek taç yaprakları %60-70 döküldüğünde,
3. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayvada Möniliya:

- 1.ilaçlama: Çiçeklerin %5 açtığı dönemde
- 2.ilaçlama: Çiçeklerin %50'si açtığında
3. ilaçlama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Antepfıstığında Karazenk:

İlk ilaçlama hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllemeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Narda Kahverengi leke hastalığı:1. ilaçlama: Çiçek tomurcuqları belirginleşmeye başladığı dönemde,
2. ilaçlama: Taç yapraklar döküldüğünde
3. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Vixen adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2,7+C3,11olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Vixen**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2,7+C3,11harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımın bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.



VIXEN

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

% 25.2 Boscalid+%12.8 Pyraclostrobin
2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide+
methylN-{2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate

GRUBU	C2,7+C3,11	FUNGİSİT
-------	------------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa hastayı kusturmaya çalışmayın. Ağzını temiz suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım çağırın. Hastaya yağ, süt veya alkol gibi emilmeyi arttırıcı maddeler verilmemelidir. Hasta bayılmışsa temiz havaya çıkarılmalı ve doktor çağırılmalıdır. Göze bulaşması halinde 10-15 dakika süreyle yıkayın ve doktora gösterin.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
18 Nisan 2016

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar,Torbali-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Bekir Saydam Cad.Pancar No:45
Torbali/İZMİR

Ulaşan Tahsin V.D. 008 075 0604 Tlc.Sic.No:3749

Dr.Alanur HAS