

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su	14 gün
	Elma ağ kurdu (<i>Ipponomeuta malinellus</i>)	20 ml/100 L su	
	*Yaprak galeri güvesi (<i>Leucopetra scitella</i>)	20 ml/100 L su	
ARMUT	Armut yaprak psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	25 ml+50 ml yayıcı yapıştırıcı 100 L su	14 gün
PAMUK	Pamuk yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)	30 ml/da	14 gün

*Elma içkurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca Galerî güvesi'ne karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalı ve gerekli miktarda su depoya ilave edilmelidir. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

GIDA TARIM VE İLKYAPILCIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22.03.2011

Abdülkavak
Genel Müdür Yardımcısı

AGRI SCIENCES Tamm ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI
SCIENCES

AFFLURON

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 480 g /L Diflubenzuron
1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

GRUBU	İS	İNSEKTİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA
ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI
SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ,
SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1
GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastanın ilaçla buluştuğu vücut kısımlarını sabunlu su ile yıka,
göze değmişse 15 dakika su ile yıka, doktor çağır, ilaç ambalajı
ve etiketini birlikte götür.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N:Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

DİFLUBENZURON İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R50: Sıcul organizmalar için çok toksiktir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kiilt altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatma/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tamm ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancaç,Torbalt-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Uygulama Zamanı:

Elma içkürdü mücadelesinde: İlaçlamaya başlamak için her dölde cinsel çekici tuzaklardaki kontrol ve sayımlar dikkate alınır. Kelebek uçuşları, zararlıların biyolojisi, ağaçların fenolojik durumu ve yayımcı kuruluşlardan alınan bilgilerin ışığında ilaçlamalara geçilir.

Elma ağkürdü mücadelesinde: Larvalar yaprak epidermisini terk edip ilk ağlarını örmeye başladıkları zaman tek ilaçlama yapılır.

Yaprak galeri güvesi mücadelesinde: Fare kulağı dönemi ve çiçek taç yapraklarının çoğunluğunun döktüğü dönemde başlanır. 2. ve 3. ilaçlamaya popülasyon yoğunluğuna göre devam edilir.

Armut psilidi mücadelesinde: Nisan ayı başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2 ve 3 yaşlı nimfler görülmeye başladığı zaman yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir.

Pamuk yaprak kurdü mücadelesinde: Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurtalı paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilir. İlaçlama larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Affluron adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Affluron**'un aynı üretim sezonunu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU :

Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22.05.2011
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Genel Müdürü

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



AFFLURON

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Madde Adı ve Miktarı: 480 g/L Diflubenzuron
1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

GRUBU	15	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- * Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilaç fitotoksik değildir.
- *Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Fakat ilaçlamadan hemen sonra yağmur yağmırsa, ilaçlama tekrarlanabilir.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan çekininiz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79