

555

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU VE DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
|---------------|---|----------------|--|
| ŞEKER PANCARI | Cercospora yaprak lekesi hastalığı (<i>Cercospora belfieldii</i>) | 50 ml/da | 28 gün |
| | Pas (<i>Puccinia</i> spp.) | | |
| BUĞDAY | Küllenme (<i>Erysiphe graminis</i> f.sp. <i>tritici</i>) | 60 ml/da | 35 gün |
| | Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>) | | |

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

Sistemik özellikte, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisitir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması: İlaçlama aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. İlacın kutu kapağı açılmadan iyice çalkalanmalı ve gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

Uygulama Zamanı:

Şeker pancarının yaşı yapraklarında % 5 lekelenme sınırına ulaştığında ilaçlamaya başlanmalıdır ve 15-20 gün arayla tekrarlanmalıdır. Buğday pas hastalıklarında ilk belirtiler görülmeye başladığında ilk ilaçlama, ilk ilaçlamadan 21-28 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Epidemiy ihtimali varsa 3. ilaçlama yapılabilir. Buğday küllenmesi ve Septorya yaprak lekesi hastalıklarında ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

BU İLACIN VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Devamı 2.sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L. Şti.



FENAMID 50 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Epoixiconazole+thiophanate -
methyl 187+310 g/L
(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole+ dimethyl 4,4'-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

| GRUBU | G1-B1 | FUNGİSİT |
|-------|-------|----------|
|-------|-------|----------|

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KİTİSİNLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

09 Ekim 2014

Dr. Yunus EYRAM
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn:Zararlı N: Çevre için Tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn:Zararlı N: Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Epoixiconazole ve Thiophanate methyl içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R20: Solunması halinde zararlıdır.

R40: Kanserojenlik etki için sınırlı delil.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R62: Doğurganlığı azaltıma olası riski.

R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

R68: Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36: Uygun koruyucu giysi giyin.

S37: Uygun koruyucu eldiven takın

S40: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık yerinde bertaraf edin/ ettirin.

AGRI SCIENCES
ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-Z/163
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16159 V.D. 0000475/0004 T.C. No:37

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Fenamid 50 SC adlı bitki koruma göre Grup G1-B1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Fenamid 50 SC'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1-B1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU:

Eğer bir karışım yapılacaksa aynı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların beklentileden kullanılmasında tavsiye edilir.

**FENAMID 50 SC****Süspansiyon Konsantre (SC)****Aktif Madde Adı ve Miktarı:**

Epoxiconazole+thiophanate -
methyl 187+310 g/L

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole-4-dimethyl 4,4-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| GRUBU | G1-B1 | FUNGİSİT |
|--------------|--------------|-----------------|

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Göz ile temasında en az 15 dakika göz kapağı açılarak yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa, ağız bol su ile yıkanmalı ve bol miktarda su içirilmelidir. Zehirlenme durumunda doktor çağırılmalı ve ilacın etiketi gösterilmelidir.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Dr. Yunus BAYRAM
Daire Başkanı

09 Ekim 2014

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK**HUSUSLAR:**

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Bahçalar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar 31/31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 078 880 / Tic Sic No: 27716

ADA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ADA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

(Handwritten signature)