

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
SEBZE	Baklagil tohum böcekleri (<i>Bruchus</i> spp.)	40 ml / da	7 gün
	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 ml/da-Larva	
	Bozkurt (<i>Agrotis</i> spp.)	40 ml/da, Larva (ilaç yeşil aksama ve toprağa pülverize edilir)	
MEYVE	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	30 ml/da-Larva	7 gün
	Ağaç kızılkurdu (<i>Cossus cossus</i>)	80 ml / 100 L su (Genç larva dönemi)	
ARMUT	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su, Larva (yumurtla açılışı takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)	7 gün
	Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	20 ml / 100 L su (Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde)	
ANTEP FISTIĞI	Antep fıstığı psilidi (<i>Agonoseena pistaciae</i>)	25 ml / 100 L su, (Yaprakların % 20 si buluşuk olduğunda ilk ilaçlama yapılır)	7 gün
AY ÇİÇEĞİ	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	40 ml / 100 L su	7 gün
	Nergis soğan sinekleri (<i>Eumerus narcissi-Merodon eques</i>)	80 ml / 100 L su	7 gün
MISIR	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>)	30 ml / da- Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	7 gün
	Mısır Kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml / da- Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVARİ

Devamı 2. sayfada

24 Kasım 2011

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

DANTE 25 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Madenin Adı ve Miktarı: Litrede 250 g Cypermethrin (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (IRS)- cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU 3, A **İNSEKTİSİT**

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T: TOKSİK N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T: Toksik

N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

CYPERMETHRİN VE KSİLEN İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R25: Yutulması halinde toksiktir.

R48/22: Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R37: Solunum sistemini tahriş eder.

R38: Cildi tahriş eder.

R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53: Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.


ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pançar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI

Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Torbalı



Devamı 2. sayfada

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HUBUBAT	Süne (<i>Eurygaster integriceps</i>)	20 ml /da 1-3 dönem 30 ml / da, 4-5 dönem Nimf- yeni nesil ergin	7 gün
GENEL ZARARLILAR	Çekirgeler (<i>Locusts</i>)	40 ml / da	7 gün
BAĞ	*Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 L su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilaçlama yapılır)	7 gün
DİŞBUDAK	Amerikan beyaz kelebeği (<i>Hyphantria cunea</i>)	25 ml/100 L su-Genç larva dönemi	--
ŞEKER PANCARI	Yaprak kurtları (<i>Spodoptera exiguca</i> , <i>Manisrastra</i> spp., <i>Plusia gamma</i>)	30 ml / da	7 gün
	Pancar piresi (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	25 ml / da	
	Kalkan böcekleri (<i>Cassida</i> spp.)	30 ml / da	
	Yaprak böceği (<i>Piesma maculata</i>)	30 ml / da	

*Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

24 Kasım 2011

M/14 don



DANTE 25 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 250 g Cypermethrin (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (IRS,3RS,IRS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU	3, A	İNSEKTİSİT
-------	------	------------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler başlangıçta mide bulantısı, kusma karın ağrısı ve ishaldir. İlaç ile temas deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaç göze bulaşmış ise; göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan su ile 10-15 dakika yıkayınız. Derhal doktora başvurunuz. Eğer ilaç yutulmuş ise; hastanın bilinci yerinde ise kusturunuz.

Baygun hastayı kusturmaya çalışmayınız. Ambalaj ile birlikte hastayı derhal doktora götürünüz. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre destekleyici tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda köpük, karbondioksit, yangın söndürme tozu kullanınız.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S:46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79



KULLANMA ŞEKLİ:

Dante 25 EC temas ve mide yoluyla zararlı böceklerle karşı yüksek derecede etkilidir. Lepidopter larvalarına karşı yüksek edki alabilmek için larvalar küçük 1. ve 2. dönem) iken ilaçlama yapılmalıdır.

Dante 25 EC yer aletleri ile uygulanabilir, ancak bu taktirde iyi bir kaplama yapılabilir. Zararlı durumuna göre ilaçlamalar 7-21 günde bir tekrarlanmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçlama Zamanı:

Bağ: Salkım güvesi'ne karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeyssel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlaması birinci dölde akşamüstü sıcaklıkların iki gün üst üste 15 °C'yi aşması ve süreklilik göstermesi etkili sıcaklıklar toplamına 1. Dölde 120 gd (gün derece) 2. Dölde 520 gd 3. Dölde 1047 gd ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlama başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek ilaçlama yapılır. Her dölde bir ilaçlama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden yeni yumurta bulunduğu sürece ilacın etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak ilaçlamalara devam edilir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belini alındaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzünce istatılır. Harcanan su beirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce bir miktar su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım yarı yarıya su dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlut her zaman çok iyi karıştırılmali birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinde daha fazla mahlut hazırlanmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Dante 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3,A olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Dante 25 EC'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3,A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.


KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

Dante 25 EC ilacı birçok ilaç insektisit, fungisit ve akarisitlerle karışabilirse de büyük miktarlarda karışımlar hazırlanmadan önce basit ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.

(Handwritten signature)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KÖRÜK ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Ekim 2011



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



DANTE 25 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 250 g Cypermethrin (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (IRS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU	3, A	İNSEKTİSİT
-------	------	------------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARIKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Ariılara zehirlidir.
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yertüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzaktaki çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. +35 °C'nin üzerinde ve -5°C'nin altında depolamayınız. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda açılmamış ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79