



# ULTIMATRIX

Kuru Akıcı Konsantre (DF)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:  
% 22.5 Famoxadone + % 30 Cymoxanil

Famoxadone: 5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-8phenylamine)  
2,4-oxazolidinedione+  
Cymoxanil: 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyamino)  
acetamide

GRUBU 11, C3 / 27, U FUNGİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK  
TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA  
ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK  
KULLANINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA  
HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA  
KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN  
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

2012  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

## KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARALI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HİYAR	Yalancı mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	40 g/100 L su	3 gün
DOMATES	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	3 gün
	Erken yaprak yamırlığı ( <i>Alternaria solani</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	
BAĞ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40 g/100 L su	28 gün
PATATES	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/da	14 gün

## KULLANMA ŞEKLİ:

### İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:

İlaç hazırlanmadan önce ilaça kademli temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurularak. **Ultimatrix** ayrı bir kapta bir miktar su ile eritilerek depoya konulur. Mekanik ya da hidrolik karıştırıcı ile iyice karıştırılır ve kalan su miktarı depoya ilave edilir. Karıştırılmaya ilaçlama boyunca devam edilmelidir.

İlaçlama sırasında bitki iyi bir şekilde ilaçlanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama havanın serin ve sakın zamanlarında yapılmalıdır. İlaçlama esnasında ilaç zerrecikleri ve buharından korununuz.

**Hiyarda** Yalancı mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarda ilaçlamaya devam edilir.

**Domateste** Mildiyö ve Erken yaprak yamırlığı hastalıklarına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarda ilaçlamaya devam edilir.



2012  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Devamı 2. sayfada

Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı :

## TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı N: Çevre İçin Tehlikeli  
TEHLİKE SEMBOLLERİ



Xn: Zararlı

N: Çevre İçin Tehlikeli

## İÇİNDEKİLER:

Famoxadone ve Cymoxanil içerir.

## UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R22 : Yutulması halinde zararlıdır.

R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R48/22 : Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R50 : Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53 : Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

## GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13 : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 : Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S24 : Cilt ile temasından sakının.

S29 : Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ ettirin.

## ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232-8641333 Fax: 0232-8641679

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
**AGRI SCIENCES**

Bekir Saydam Cad. Pancar, Torbalı-İZMİR  
Torbalı-İZMİR

Torbalı-İZMİR

**Bağda** Mildiyö hastalığına karşı süngünlük 25-30 cm'ye ulaştığında ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.

**Patateste** Mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.

**Ultimatrx** ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün, domates ve hiyarda 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

**Ultimatrx** farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisitir.

**Ultimatrx** ilaçlamadan 2 saat sonra yağın yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

#### Fitotoksisite:


**Ultimatrx** tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**Ultimatrx** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 11, C3 / 27, U olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Ultimatrx**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 11, C3 / 27, U harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

**Ultimatrx** bilinen pek çok fungisit ve insektisiflerle karışabilir. Alkali özellikte ilaçlarla karıştırmayınız. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışılabilirliğinden önce küçük çapta denemesi tavsiye edilir.



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



## ULTIMATRIX

Kuru Akıcı Konsantr (DF)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

% 22.5 Famoxadone + % 30 Cymoxanil

Famoxadone: 5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-8phenylamine)  
2,4-oxazolinedione+  
Cymoxanil: 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyamino)  
acetamide

GRUBU	11, C3 / 27, U	FUNGİSİT
-------	----------------	----------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Gastrointestinal irritasyon, yanma, diyare, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

Yutulması halinde: 1-2 bardak su içirin ve hastayı tıbbi yardım olmadan kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen doktor çağırın.

Soluması halinde: Hastayı temiz ve iyi havalandırılmış bir yere götürün, eğer nefes almıyorsa suni teneffüs yapın. Ciddi zehirlenme durumunda derhal doktor çağırın.

Gözle teması halinde: 15 dakika süreyle gözü ve göz kapağını suyla yıkayın. Gözde tahriş devam ediyorsa derhal doktor çağırın.

Deri ile teması durumunda: Bol su ve sabunla yıkayın.

**ANTİDOTU:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzaktaki çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

### FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine kaitlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LİTD. ŞTİ  
Bekir Saydam Cad. Pancar, No: 31  
Torbalı/İZMİR

Torbalı M. 008 075 8604