

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası : 07.09.2015 / 10345

KULLANILACAK İTİKİ VE ZARARLI YABANCİ OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCİ OTLAR	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ŞEKERPANCARI, PAMUK, MERCİMEK, SOĞAN, SOYA FASULYESİ, FASULYE	Yıllık çimensi otlar Darcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yabani yulaf (<i>Avena</i> spp.) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Delice (<i>Lolium rigidum</i>) Kaz çimi (<i>Elysin indica</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	40-50 ml/da+ 2 kısım yayıcı yapıştırıcı	60 gün
	Kendi gelen Buğday, Arpa (<i>Triticum</i> spp.) Çok yıllık yabancı otlar Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>) Kendi gelen Buğday, Arpa, (<i>Triticum</i> spp.) Delice (<i>Lolium rigidum</i>) Salkımotu=Buy (<i>Poa trivialis</i>) Kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>)	30-40 g/da+ 2 kısım yayıcı yapıştırıcı 80 ml/da +2 kısım yayıcı yapıştırıcı	60 gün
KİMYON		30 g/da	60 gün

[Signature]
Başkan

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



CLOOP

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 240 g /L Clethodim (+/-) 2-[3-chloroallyloxymino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-hydroxycyclohex-2-enone

GRUBU	A	HERBİSİT
-------	---	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

07 Eylül 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:



XN: ZARARLI

İÇİNDEKİLER:

Clethodim ve Ksilen içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S17: Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.

S36: Uygun koruyucu giysi giyin.

S37: Uygun eldiven giyin.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise.)

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

İşletme Tescin V.D. 008 055901 Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

[Signature]

2.sayfa

Cloop, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinden yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendi gelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir. Uygulanmadan hemen sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere taşınır. Özellikle Kaynaş gibi çok yıllık otlarda risomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün münavebesinde problem çıkarmaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:

İlaç önce ayrı bir kap içinde yayıcı yapıştırıcı ile birlikte suda eritiniz. Bir kısım ilaca 2 kısım yayıcı yapıştırıcı karıştırınız (1:2). İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak, hazırladığınız ilaçlı mahlülü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmaktadır. Bunun için ilaçlamaya geçmeden önce aletinizi kalibrasyon yapınız. Yer alelerinde dekara 20-40 litre su kullanınız.

Uygulama Zamanı:

Cloop çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.

Cloop uygulananmış alana geniş yapraklı yabancı otlarla mücadele için kullanılacak herbisidler en az 24 saat sonra atılmalıdır.

-Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir.

-İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır.

-Bir saat içinde yağmur beklenmesi halinde ilaçlamayı ertelemeyiniz.

-Sulama yapılan alanlarda ilaçlamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız.

-İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur. Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tespit edilir. Daha sonra tespit edilen su miktarı ile gerekli ilaç miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Cloop adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cloop'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

Cloop tavsiye edildiği kültür bitkilerinde Deltamethrin ve Endosulfan terkipli insektisitlerle karışım halinde kullanılabilir.

[Signature]
Başkan
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



CLOOP

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 240 g /L Clethodim
(+)-2-[3-chloroallyloxymino]propyl]-5-[2-(ethythio)propyl]-hydroxycyclohex-2-enone

GRUBU	A	HERBİSİT
-------	---	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Uygulayıcılar için zararlı etkisi en az olan ilaçlardır. Yine de genel koruma uyarılarına dikkat ediniz.

Göze buluşması halinde; geçici olarak ağrı, göz yaşı, kızamıklık, görmede bozukluk yapılabilir.

Deriye teması halinde; geçici olarak ağrı, steklik hissetme, kızamıklık ve kabarıklara neden olabilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Göze teması halinde; göz kapaklarını açık tutarak bol su ile en az 15 dakika yıkayınız ve doktora başvurunuz.

Deriye teması halinde; ilaça bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız, ilacın deriye temas eden kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Hassasiyet devam ediyorsa derhal doktora başvurunuz.

Yutulması halinde; hastaya tercihen süt veya su içirip derhal doktora başvurunuz. Tıbbi personel olmadan hastayı kusturmayınız. Tıbbi yardım alınması halinde hastayı ilaç ambalaj ve etiketini yanınıza alarak derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürünüz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

İlaç petrol yapılı solvent ihtiva ettiğinden aspirasyon zararlı olabilir. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Arılara zehirli değildir. Balıklara zarsızdır.

* İlaç mutlaka yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanınız. 1 kısım ilaca 2 kısım yayıcı-yapıştırıcı ilave ederek kullanınız.

* İlaçlı mahlülün hedef dışına sürüklenmemesi için rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.

* Hazırlanan ilaçlı mahlülün tümü tarlaya püskürtülmelidir.

* Hazırlanmış ilaçlı mahlül aynı gün içinde kullanılmalıdır.

* Koruma tedbirlerine riayet edilmeli, tıkanmış memeler ağır ile üflenerek açılmalı, fırça ile temizlenmelidir

* İş bittikten sonra ilaçlama ekipmanı iyice temizlenmelidir. Temizleme işlemi yapılmadan bu aletleri diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

* Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Ustüne uygun bir şekilde imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHİ ve İLAÇ ÜR SAN VE TİC LTD ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar/No.31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 075 860 13 33 No:3749

07 Eylül 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR