

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARALI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMAYLA İLE HASAT ARASINDA KİSİRE
BAĞ	Milidyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	175 g/100 L su	14 gün
ZEYTİN	Halkalı teke hastalığı ( <i>Spiloozeae oleagina</i> )	175 g/100 L su	14 gün
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	200 g/100 L su	14 gün

#### KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:  
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Daha sonra yarıya kadar su ile doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilir. Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalıdır. Sonra geri kalan kısmı su ile tamamlanır. Cyclafon ilacı ortamın pH'ı 6,5'ten daha düşük olan eriyiğe karıştırılmamalıdır. Aksi halde birlikte yakma yapabilir.

#### Uygulama Zamanı:

Bağda Milidyö: İlaçlamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalı, hava şartlarına ve hastalığın gelişme durumuna göre 7-10 gün aralar ile devam edilmelidir. Hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığına ilaçlamalara son verilmelidir. İlaçlamalarda asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlamasına dikkat edilmelidir. Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanmasına sağlanmalıdır. İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde yapılmalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



## CYCLAFON

Suda Dağılabilen Kuru Akışkan Granül (DF)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Bakır hidroksit % 53,8(%635 metalik bakıra eşdeğerdır)

GRUBU	Mİ	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE VEVEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA İ GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.  
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

25 Şubat 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



N: Çevre için tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

BAKIR HİDROKSİT İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:  
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. Pancar No. 31

Torbalı (İZMİR)

Torbalı V.D. 000 075 8604

Devam 2. sayfada

2. sayfa

**Zeytinde Halkalı Leke:** Marmara Bölgesi'nde birinci ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, ikinci ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında yapılmaktadır. Ege Bölgesi'nde ilk ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, ikinci ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılır.

**Domatesde Erken Yaprak Yauklığı:** İlaçlamaya çevrede ilk hasatlık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve ilaçlama hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Cyclafon adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cyclafon'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup M1 harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Cyclafon ilacı Fosetyl-Al etkili maddeli fungisit ile ortamın pH'ı ayarlanmadan karıştırılmamalıdır. Aksi halde fitoksite meydana gelebilir. İlaçların karışabilirlik durumu bilinmiyorsa, ilaç aletin deposuna ilave edilmeden önce "kavanoz testi" uygulanmalıdır. Karıştırılmadan önce ilaçların etiketlerindeki karışabilirlik ile ilgili bilgileri dikkatle okunmalıdır. Daha fazla bilgi için ilacın ruhsat sahibine veya satıcı firmaya başvurunuz.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Dağılabilen Kuru Akışkan Granül(DF)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Bakır hidroksit % 53,8(%35 metalik bakıra eşdeğerdir)

GRUBU	Mİ	FUNGİSİT
-------	----	----------

#### **ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Hızlı soluma, simirlik, kanlı ishal, heyecan, bulamık görme, baş dönmesi, baş ağrısı, yeşil-mavi renkli kusma, burun akıntısı, ağızda metalik tat, su ve elektrolit kaybı, halsizlik.

#### **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göze bulaşmışsa göz kapaklarını açık tutunuz ve onbeş dakika boyunca su ile yıkayınız. Hastayı ilaçı yerden uzaklaştırınız ve suni teneffüs yapınız. Ağız yoluyla yutulmuş ise bol süt, yumurta akı ve jelatin solüsyonu içiriniz. Eğer bunlar yoksa bol su içiriniz ve hastayı kusturunuz.

#### **ANTİDOTEVE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkamır. Kan dolaşımına yardım amacı ile Plazma ve Novadrol verilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

25 Şubat 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

#### **KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

\*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

\*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

\*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

\*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

\*Balıklar için zehirlidir.

\*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### **DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzaktaki çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

#### **FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### **ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**


Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Torbalı/İZMİR

Torbalı V.D. No: 58504



Handwritten signature and initials