

İmza Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarihi ve No: 31.12.2004 /5001

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu ve Dönemi

Tütün Fidelede çöktüren (*Rhizoctonia spp.*, *Phytophthora citrophilora*)MEYVELER *Pythium spp.*, *Fusicarium spp.*, *Alternaria spp.*, *Sclerotinia spp.*Armut Karaleke (*Venturia pirina*)Elma Karaleke (*Venturia inaequalis*)Erik Cep hastalığı (*Tapirina Pruni*)Şeftali, Kayısı Monilya (*Sclerotinia laxa*)Şeftali, Kayısı Yaprak deleni (*Wilsonomyces carpophylla*)

Tunağaçlar Kalıverengi çürüklük

Yeni dünya (*Phytophthora citrophilora*)BAĞ Karaleke (*V. inaequalis* var. *erriobotryae*)(*) Bağ Ölüklük (*Phomopsis viticola*)Bağ Milidiyö (*Plasmopora viticola*)

SEBZELER Kök çürüklüğü (çökerten)

Fideleri (*Pythium spp.*, *Fusicarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Alternaria spp.*)(Fidelik) *Sclerotinia spp.*, *Phytophthora spp.*Domates Milidiyö (*Phytophthora infestans*)Mandı Milidiyö (*Bremia lactucae*)Soğan Milidiyö (*Peronospora destructor*)Sebzeler Kurşuni küf (*Botrytis cinerea*)ENDÜSTRİ Pas (*Uromyces dianthi*)BITKİLERİ Karanfil Milidiyö (*Phytophthora infestans*)

Patates

*Yaz uygulamasında kullanılır.

**Fidelik ilaçlarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerektiği miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktarda su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su depoya ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Konuyu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta kara lekeler: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama çiçek aç yaprakları % 70-80 döktükten, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartları ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile

Elma (kara lekeler): 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), 3. ilaçlama çiçek aç yaprakları % 70-80 döktükten, 4. ve diğer ilaçlamalar etolojik koşulları

Erik cep hastalığı için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik cep hastalığı: 1. ilaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek aç yapraklarının %80 döktüğün dönemde yapılmalıdır.

Şeftali monilya: ilaçlama çiçeklenmeye başladığında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır

Kayısı yaprak deleni: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak döktükünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde külf sıyrılınca yapılmalıdır.

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

Etiler

FİRMA ADI VE AMBLEMİ
AGRI SCIENCES TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AGRI SCIENCES

İLACIN TİCARİ ADI

ODEON 50 WP

FUNGİSİT (Manar İlacı)

Suda Islanabilir Toz (WP)

Etkili madde ve miktar: %50 w/w Captan içerir

N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxamide (IUPAC)

Şahtalarda akut ağzardan LD₅₀: 9000 mg/kg**DİKKAT**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. - - - İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ. - DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:


Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

İlaçla bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Şayet ilaç yutulmuşsa hastayı kusturmayınız. Göze kaçmışsa göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan suyla 10-15 dakika yıkayınız. Doktora baş vurunuz. İlaç ambalajını ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU : Toksikitesi düşük olup, özel bir antidotu yoktur.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Genel Müdür Yakub Çiçek

02 Temmuz 2010

Net Miktarı:

Brüt Ağırlığı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

* Göz konyüvensi (gözülük) kullanınız.

* Kullanılmayan ilaçları ağız sıkıca kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve gıdalardan uzakta kilit altında tutunuz.

* Artıları zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanınız.

* Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

* Fazla sıcak olmayan serin ve kuru depolarda muhafaza edilmelidir.

* Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal depolama şartlarıdır, serin ve kuru depolarda ve orijinal ambalajı içerisinde depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre içerisinde tolerans sınırları dışarısında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlaç orijinal ambalajında normal depolama şartlarında muhafaza edilmesi ve açık ambalajlarda satılmaması kaydı ile imalatçıları ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Ancak ilacın tavsiyeler dışında hatalı ve düzensiz kullanmasından, hatalı depolanması ve uygulanmasından meydana gelecek zararları için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad.

No:31 Pancar Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

Mohamed Ali Ağ
AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
Torbalı / İZMİR

Torbalı V.D: 008 075 8604



İLACIN TİCARİ ADI

ODEON 50 WP

FUNGİSİT (Manitar İlacı)

Suda Islanabilir Toz (WP)

Etkili madde ve miktar: %50 w/w Captan içerir

N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxamide (IUPAC)

Sıcaklarda akut ağızdan LD₅₀: 9000 mg/kg**DİKKAT**

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Şeftali yaprak deleni: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak döktümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurukları açılmadan önce yapılmalıdır.

Turuncuğillerde kahverengi çürüklük: 1. ilaçlama sonbaharda yağışlar başlamadan önce ekim ayında yapılır. Havalar yağışlı gelderse 2. ilaçlama 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.

Yeni dünyada karateke: 1. ilaçlama sonbaharda çiçek tomurukları kabarmadan önce, 2. ilaçlama çiçek tomurukları açılmadan önce, 3. ilaçlama çiçek teş yapraklarının döktülmesinden sonra, 4. ve diğer ilaçlamalar 3. ilaçlamadan basında 20 gün kalıncaya kadar 10'ar gün arayın yapılır.

Bağda öfiftoft: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösi: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalar hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde kök çürüklüğü (çökerten): Fidelette hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta rayla ilaçlama yapılır.

Domates mildiyösi: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kal gibi komidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates yaprak kütü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul mildiyösi: Çevredeki ilk hastalık belirtisi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncecine kadar ilaçlamaya devam edilir.

Soğan mildiyösi: Çevredeki ilk hastalık belirtisi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Karantfil pası: Çeşitler suya geçirilmenden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates mildiyösi: Hastalığın her yıl görüldüğü alanda hastalık belirtileri görülmeyen günlük ortalama sıcaklığı 16 C° veya en düşük sıcaklık 10 C° yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmeyeceği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havanın kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulamaya, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU

Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Karıştırılmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir. Lambda cyhalothrin, Hexaconazole, Fenprosimate gibi insektisit ve fungusitlerle ve Gübrelilik asitile karışımlarda kullanılabilir. Karıştırılmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

Handwritten signature: P. A. Q. S. P.



Yoklannad AİNG
AGRI SCIENCES
 TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.
 Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
 Torbalı / İZMİR

Torbalı V.D: 008 075 8604

Genel Müdür Yardımcısı