

İnşaat Tarafı
Son Kullanma Tarafı
Satın No:
Ruhîat Taraf ve Numarası:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Für. San. ve Tic. Ltd. Şti.



KULLANILACAK İBİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZAPARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE İHAŞAT ARASINDAKI SÜRE
BAĞ	Kurşuni kük (<i>Bartsia emerei</i>)	75 g/100 L su	14 gün
DOMATES	Kurşuni kük (<i>Bartsia emerei</i>)	75 g/100 L su	7 gün
HİYAR	Erken yaprak çanaklığı (<i>Aethomaria solana</i>)	100 g/100 L su	
KAYISI	Bayraz çürüklik (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	75 g/100 L su	7 gün
TURUNCIGİL	Çiçek moniliyası (<i>Monilia laxa</i>)	150 g/100 L su	14 gün
	Kalverençi leke hastalığı	100 g/100 L su	14 gün
	<i>Catherina alternata</i> <i>f. speciosa</i>		

GRUBU 2, E3 FÜNGİSİR

ÖNCELİKLE İLK İOKUNUNUZ.
EVDE KULLANMAMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BULJAR VE/veya
ZERRİLLERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, HİDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN ÜYGULANMASI
SIRASINDA HİC BİR SEY YEMEYİNİZ, İKMİYİNİZ,
SIGARA KULLANMAMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHİYA 1
GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÇİÇENLERİN DISINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANMA ŞEKLİ:

İçermeyen Uygulama Hazzırlaması:
İçermeyen tankum yarına katar su doldurunuz. Ayrı bir karpak içinde gerçek miktar İlaç etimiziye, alcuni kanatlığınıza, çiçeklerin içi, yapraklar, hizalı halde ediniz ve içermi so-

racı tamamlayınız. Hazırlanmış mahlûku aynı gün kullanınız.
Bağlana rüzgarlı, bir havada yapılmalı, bitkîm işice İslâmmasına ancak
içmen akımanasına dikkat edilmelidir. Bayda salkımların her tarafının içice
ilaçlanması gerekmektedir.

Uygulama Zamanı:
Bağda Kurşuni kük: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya
ilaçlamaya başlanmalıdır.

Domatese Kurşuni kük: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya
bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. 10 gün sonra ikinci ilaçlama
yapılır.

Domatese Erken yaprak yanıkları: İlk lekelere 20 gün içinde başlanır

GIDA TİRAZI VE HAYVAN İLAÇLARI İŞ BANKASI
GIDA VE KONTROL GENEL Müdüriyet
İSTANBUL İL İLAÇ İLAÇLAMA İŞ BANKASI

Net Miktarı
Azami Perakende Satış Fiyatı

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

TEHLIKE ÖZELLİĞİ:

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

TEHLIKE SEMBOLLERİ:



N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

İÇİNDEKİLER:

IPRODIONE İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RISK İBARESİ VE
AÇIKLAMASI:

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delit.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kült altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden, ilaçlardan ve hayvan yemlerinden uzak
tutun.

S29/56: Kanalizasyon sisteme boşaltmayın. Ağdırıcı ve kabini
tehlîkeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Vücuttan hızlı bir şekilde hemen bir doktorbaşvurun, kabi veya
eneketi gösterin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Für. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pançar-Torbali-ZMİR
Tel: 0232 364 13 33 Fax: 0232 864 16 79

19 Aralık 2012

AGRI SCIENCES
Bekir Saydam Cad. No:31 Pançar-Torbali-ZMİR
Tel: 0232 364 13 33 Fax: 0232 864 16 79

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

N: Çevre İçin Zararlı
X: Zararlı (kanserojen kat.3)

Hıyararda Beyaz çürüklik: İlk lekeler göründüğünde ilaçlamaya başlanır.

1. ilaçlama çökeğimme başlangıcında (%5-10 çökeğim) yapılır.
2. ilaçlama tam vücutte (%90-100 çökeğim) yapılır.

Turuncigölde Kahverengi leke: İkbalharda bulşınaların görünümesiyle birlikte 10 gün arayla ilaçlama yapılır.

DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ:

Hickory adlı bitki koruma ürünu, etki mekanizmasına göre Grup 2.E3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlüğünün tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için Hickory'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 2.E3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU:

Bordo Bulanacı dışındaki fungisitler, insektisitler ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabılır. Büyüük mikarda karışım yapmadan önce fiziksel karıştırılılıktır testi yapılması önerilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HÜSUSLAR:



HICKORY

İslanabilir Toz (WP)

Aktif Maddedenin Adı ve Miktarı: % 50 Iprodione
3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide

GRUBU	2. E3	FUNGİSİT

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HÜSUSLAR:

*Bitki koruma ürünumü ambalajında kapaklı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünu koymayınız.

*Yeraltı ve yerüstü sulalara bulastırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlac orijinal ambalaj içinde, ağzı kapaklı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyecegi serin ve kuru bir yerde kilit alanda muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve ağırlamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilaçın orijinal ambalajında saftırmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü düşmekteki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilaçın uygun olmayan şartlarda depolamaması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Aşırı doza alındığında kaslarda gerilme, refleks azalması ve haretlerde dengesizlik yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme halinde doktor eğrınız ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz. İlaç teneffüs edilmişse hastayı temiz havaya ekleyiniz. İlaçla bulastık elbiseleri çıkınız. İlaçla bulasılan vücut kısımlarını bol su ve sabunlu yıkayınız.

ANTIİBİDÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir amidet yoktur, belirtilere göre tedavi AGRİ SCIENCES Farm ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar Torbalı-ZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Uluslararası Danışma Merkezi (UZEM) Tel: 114

AGRI SCIENCES
İLAÇ ve TARIM SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Vicaklar Saydam Cad. 51
Torbalı / Izmir
+544 322 008 075 0604
İhsan Taşhan VD

19 Mart 2012

GIDA ve İĞİTİRİLİK İŞLETMELERİ İŞLETİMİ
GIDA ve İĞİTİRİLİK İŞLETMELERİ İŞLETİMİ

KARŞIYAKA İŞLETİMİ
KARŞIYAKA İŞLETİMİ