

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARALI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	Pamuk yaprak kurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	37,5 ml/da (2. ve 3. dönem larva)	21 gün
BAĞ	Salkım güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	40 ml/100 L su (Larva, yumurta)	7 gün
ELMA	Elma iç kurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	60 ml/100 L su (Larva)	14 gün
DOMATES (Sera)	Pamuk yaprak kurdu ( <i>Spodoptera littoralis</i> )	50 ml/da (Larva)	1 gün

### KULLANMA ŞEKLİ:

- Elma iç kurdu'na karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her dölde ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döflere ait ilk ilaçlama zamanı sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Birinci dölde karşı iki, ikinci dölde karşı bir olmak üzere üç ilaçlama yapılır.
- Bağda Salkım güvesi için ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşmış düşmeye başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının birinci dölde 120 gündece, ikinci dölde 520 gündece, üçüncü dölde 1047 gündeceye ulaşması fenolojik olarak birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde yumurta arar ve yumurta açılımına göre ilaçlamaya karar verilir. Her dölde bir ilaçlama yapılır.
- Domateste (sera) Pamuk yaprak kurdu'na karşı ilaçlama, yumurta paketlerinin bırakılması ve zararlıların çıkışı takip edilerek yapılmalıdır. Uygulama henüz yumurta paketleri açılmadan bitkilerin iç kısımları dahil ilaçlanmalıdır.
- İyi bir netice almak için ilacın tavsiye edilen dozda kullanılması şarttır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- Pb'si 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

gln

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.



## WINSOR

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g

Methoxyfenozide

N-tert-butyl-N-(3-methoxy- $\alpha$ -toluoyl)-3,5-xylohydrazide

GRUP	18	İNSEKTİSİT
------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE /VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KURUMSAL GELİŞİM BÜYÜRGÜÇÜ  
KATILIM BÖLÜMÜ



Net miktarı :

Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ  
N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ  
TEHLİKE SEMBOLÜ



N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

METHOXYFENOZİDE İÇERİR.

RİSK İBARELERİ:

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

Winsor kelebek larvalarına karşı etkili bir ilaçtır.

Mide yolu ile haşerelere etki eder.

Solvent ihtiva etmez.

Kullandığı ürünlere emniyetlidir.

Polen taşıyıcılarına, predatör ve parazitoidlere karşı zararlı değildir.

Suyla hemen karıştırdıktan her türlü aletle kullanılabilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Pancar, Torbalı-İZMİR

**Uygulamaya Hazırlanması:**

- İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gereklî miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçükle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazırladıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz.
- İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcının devamlı çalışması gereklîdir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Winsor** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18 olarak sınıflandırılmış bir insektisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Winsor** 'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 18 hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karıştırılmaz. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.

**Süspansiyon Konsantre (SC)**

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 240 g  
Methoxyfenozide

N-tert-butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

GRUP	18	İNSEKTİSİT
------	----	------------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

**Winsor** gözleri tahriş edebilir. Deride tahrişi daha hafiftir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**


İlacın deriye bulaşması halinde, ilaçla bulaşık elbiseleri çıkartın. Ciltte ilaç değen yerleri bol sabunlu su ile yıkayın. Göze bulaşması halinde asgari 15 dakika temiz su ile gözleri yıkayın. İlaç yutulmuşsa iki bardak su içirin, hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan bir şey vermeyiniz. Doktor çağırın veya ilacın ambalajı veya etiketi ile birlikte hastayı doktora götürün. Aşırı solunması halinde temiz havaya çıkarın.

**ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Arazilara göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
29 Ocak 2011

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \* Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \* Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \* Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız
- \* Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \* Sudaki canlılara orta derecede zehirlidir. Her türlü su kaynağına, akarsu ve göllere bulaştırılmamalı, ilaçlı mahsul dökülmemelidir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzaktaki çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI :**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanıır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
Torbalı-İZMİR  
Bekir Saydam