

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarı No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞLARDA	Bağ küllemesi (<i>Uncinula necator</i>)	400 g/100 L su	7 gün
MEYVE	Elma küllemesi (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Şeftali küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	400 g/100 L su 400 g/100 L su	7 gün 7 gün
SÜS BİTKİLERİ	Gül küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Begonya küllemesi (<i>Oidium begoniae</i>)	400 g/100L Su 300-350 g/100 L su	- -
SEBZE	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Nohut antraknozu (<i>Ascochyta rabiei</i>) Patlıcangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>) Soğan mildiyüsü (<i>Peronospora destructor</i>) Fasulye pası (<i>Uromyces appendiculatus</i>)	400 g/100 L su 300 g/100 L su 400 g/100 L su 300 g/100 L su 300 g/100 L su	7 gün 7 gün 7 gün 7 gün

GIDA YARINI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Devamı 2. sayfada

15 Aralık 2014

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. d. Şti.

AGRI SCIENCES

DIAFLEX

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %80 Kükürt
ağırlık /ağırlık mikromize kükürt

GRUBU	MZ	FUNGİSİT- AKARİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA
ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA
HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK
İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Büyük miktarda yutulduğunda mide bulantısı, kusma, baş ağrısı,
işhal ve uyku hali görülür

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Acil durumda derhal doktora görün, ilaç etiketini birlikte götür.
Hastayı havadar bir yere al. İlaça bulaşık elbiseleri çıkar, vücudun
bulanan kısımlarını bol su ve sabunla yıka. İlaç gözlerle sıçramışsa
göz kapagını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice çalkala.
Yutulmuş ise kusturma.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktarı :

Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xi: Tahriş Edici

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: Tahriş Edici

İÇİNDEKİLER:

Sulfür içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R38: Cildi tahriş eder.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı
bir yerde muhafaza edin.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan
yemlerinden uzak tutun.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora
başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın
(sadece kişinin bilincinde ise).

ÜRETİCİ FİRMA:

Meghmani Industries Limited
Plot No. 27, Phase - I, GIDC Industrial
Estate, Vatva, Ahmedabad, 382445, Gujarat, India

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 00810751860406 Sic No:3749

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜR
BAĞ	Bağ uyuzu (<i>Eriophyes vitis</i>) Meyve ağacı akarları	400 g/100 L su 400 g/100 L su	7 gün 7 gün
MEYVE AĞAÇLARI	(<i>Tetranychus viennensis</i> , <i>T. urticae</i>), Turunççuk akarı	600 g/100 L su 600 g/100 L su	7 gün 7 gün
NARENÇİYE	(<i>Panonychus citri</i>) *Turunççuk akarı (<i>Aceria sheldoni</i>)	600 g/100 L su 600 g/100 L su	7 gün 7 gün

(*) Kükürtlü ilaçlarla yazlık yağlar arasında 1 aylık süre olmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:

Gerekli miktar ilaç önce bir kap içerisinde az bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. İlaçlama aletin yarısına kadar su konur ve üzerine ilaşı karışım ilave edilir.

Uygulama Zamanı:

Bağ küllemesi: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken

2. ilaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca

3. ilaçlama hastalığın gelişme durumu ve bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşullarına bağlı olarak yapılır. Tanelere tatlı su yürüyünce ilaçlamalara son verilir.

Elma küllemesi: 1. ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde

2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %60- 70 'i döktülünce

3. ve diğer ilaçlamalar Mayıs ayı sonuna kadar 1 er hafta, Haziran ayının 3. haftasının sonuna kadar 10 gün ara ile diğer ilaçlamalar yapılır.

Şeftali küllemesi: 1. ilaçlama önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Eğer önceki yıllarda bahçede görülmemişse o yıl için ilk belirtiler görülünce ilaçlamaya başlanır. Diğer ilaçlamalar bitkinin gelişmesine ve hastalığın gelişimine göre 8- 12 gün aralarla hastalık baskı altına alınana kadar yapılır.



DIAFLEX

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %80 Kükürt
ağırılık/ağırlık mikromize kükürt

GRUBU	MZ	FUNGİSİT- AKARİSİT

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

* Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Arılara ve balıklara zehirli değildir.

*Kabakgiller ve kayısı kükürde hassastır.

*Yağ tatbikatlarından en az 1 ay sonra tatbik edilmelidir

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

ÜRETİCİ FİRMA:

Meghmani Industries Limited
Plot No. 27, Phase - I, GIDC Industrial Estate, Vatva, Ahmedabad, 382445, Gujarat, India


RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN ve TİC. LTD.ŞTİ
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 075 4604 20 50 11 7 7



GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİBA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Gül küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk ilaçlama yapılır. Hastalığın gelişimine göre 5-6 kez ilaçlama yapılır.

Begonya küllemesi: Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görüldüğünde başlanır, 1 er hafta ara ile ilaçlama tekrarlanır.

Kabakgillerde külleme: Bölgede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile hastalığın seyrine göre ilaçlama yapılır.

Nohut antraknozu: Bölgede nohut yapraklarında ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.

Patlicangillerde külleme: Tarlada ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamalara başlanır. 10 gün ara ile iklim koşullarına ve hastalığın seyrine göre 3-5 uygulama yapılır.

Sogan mildiyösti: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile iklim koşullarına ve hastalığın seyrine göre 3-5 uygulama yapılır.

Fasulye pası: Çevredeki bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 1 er hafta ara ile 3-5 uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Diaflex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisit-akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Diaflex**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Yazlık ve kışlık yağlarla karıştırılmaz, karışım yapılacak ilaç karışımlarının bir ön karışım yaparak denenmesinde yarar vardır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

15 Aralık 2014



DIAFLEX

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Madde nin Adı ve Miktarı: %80 Kükürt
ağırlık/ağırlık mikromize kükürt

GRUBU	M2	FUNGİSİT- AKARİSİT
-------	----	-----------------------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

FİRMA BEYANI:
İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Meghmani Industries Limited
Plot No. 27, Phase - I, GIDC Industrial Estate, Vatva, Ahmedabad, 382445, Gujarat, India

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar, No:31
Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 908 075 8602 T.C. Sic. No. 3746