

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU
BAĞ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	400 ml/100 L su
DOMATES	Mildiyö ( <i>Ptytophthora infestans</i> )	400 ml/100 L su
KABAKGİLLERDE HIYAR (Sera)	Mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	400 ml/100 L su
MARUL (Sera)	Mildiyö ( <i>Bremia lactucae</i> )	400 ml/100 L su

Son ilaçlama ile hasat arasında bekleme süresi yoktur.

### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlacın Uygulamaya Hazırlanması:**  
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Üzerine önerilen dozda Agrizate ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırılıp bu karışım yavaşça ilave edilerek depo suyla tamamlanır. Hazırlanan konsantrte karıştırılarak püskürtülür. Püskürtme esnasında karıştırmaya devam edilir ve iyi bir kaplama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Agrizate'nin kullanım zamanı önemlidir. Agrizate uygulaması için mildiyö'ye yönelik tahmin ve uyarı duyuruları dikkate alınmalı veya hastalık riskini artıran iklim koşulları oluşmaya başladığında uygulamaya geçilmelidir.

**Bağda Mildiyö:** İlk ilaçlamalara ilk sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaşınca başlanmalıdır. 2. ilaçlama ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın etki süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-12 gün ara ile ilaçlama yapılır.

**Domateste Mildiyö:** Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Dr. Niyazi  
Genel Müdür

Şişli  
SW

Devami 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.



# AGRIZATE

Suda çözümlü konsantrte (SL)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 400 g/L Fosforoz asidi  
(Mono ve di-potasyum fosphanate içerir)

GRUBU	33	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.



**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ: Xn: Zararlı; C: Aşındırıcı  
TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn: Zararlı  
C: Aşındırıcı

**İÇİNDEKİLER:**  
**FOSFOROZ ASİT İÇERİR.**

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**  
**R22:** Yutulması halinde zararlıdır.  
**R35:** Ciddi yanıklara neden olur.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**  
**S1/2:** Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

**S13:** Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

**S24/25:** Göz ve cilt ile temasından sakının.

**S26:** Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S27/28:** Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın.

**S36/37/39:** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

**S45:** Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S64:** Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilimsel yerinde ise).

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:**

**AGRI SCIENCES** Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**  
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Torbalı / İZMİR  
Hasan Tahsin 0232 864 16 79



# AGRIZATE

Suda çözümlü konsantre (SL)

**Kabakgillerde; Hiyarda Mildiyö:** Bittkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanı ve hastalığın şiddetine göre 8-10 gün aralıklarla tekrarlanır.

**Marulda Mildiyö:** Fidefiliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fideilerin şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürmelidir. Şaşırtıldıktan sonra hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla devam edilmelidir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Agrizate adlı bittki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bittki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Agrizate' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 33 harici ) bittki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞILIRLIK DURUMU:

Fitoksite nedeniyle karışımlar ilk kez uygulanacaksa karışılabilirliğini test etmeden ve karışılabilirliğini değerlendirmeden tankta karıştırmayınız ve ürünlere uygulamayınız. Emülsiyon konsantre (EC) ilaçlarla karışım yapılırken Agrizate eklenmeden önce mutlaka ayrı bir kap içerisinde önce emülsiyon konsantre ilaç eklenmeli üzerine bir miktar su ilave ederek karıştırılmalıdır.

## İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın, doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

**Deriye teması halinde,** ilaça bulaşmış kısımları bol su ve sabunla yıkayınız.

**Göze teması halinde,** bol su ile yıkayıp göz açık olarak en az 15 dakika göz banyosu yapınız. Derhal doktora başvurunuz.

**Soluması halinde,** hastayı temiz havaya çıkarınız.

**Yutulması halinde,** hastayı kusturmaya çalışmayınız. Yüzi suyla yıkayıp, ağzı bol su ile çalkalayınız. Hemen tıbbi yardım isteyin.


## ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

07 Mayıs 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

\*Bittki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

\*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

\*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

\*Boşalan gıda ve içecek kutularına bittki koruma ürünü koymayınız.

\*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

## DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

## FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar itiskine katlanı. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

## ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31

Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsin 0232-864-1679

M. K. W.