

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PAMUK	Pamukta Yaprak piresi (<i>Empoasca decipiens</i>) *Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	7.5 ml/da (nimf, ergin) 60 ml/da (larva)	7 gün 7 gün
DOMATES (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (larva)	7 gün
BAĞ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	7.5 ml/100 L su (larva)	14 gün
MISIR	Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia nonagriodes</i>) Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml/da (larva) (15 gün arayla 3 defa ilaçlama) 30 ml/da (larva) (15 gün arayla 3 defa ilaçlama)	21 gün 21 gün
ELMA	Elma iç kurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	5 ml/100 L su (larva)	7 gün
FINDIK	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	20 ml/da (ergin)	14 gün
ANTEP FISTIĞI	Antep fıstığı pisilidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 ml/100 L su (nimf)	21 gün

*Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yanına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

Kalibrasyon:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alagur-ışlatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekarâ ne kadar su harcayacağı hesaplanmış olur.



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



EXCALENCE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 200 g
Esfenvalerate
(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tsr:114

10 Temmuz 2014

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİEA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn:Zararlı N: Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn:Zararlı

N: Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Esfenvalerate içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20: Solunduğunda sağlığa zararlıdır.

R21: Cilt ile temasında zararlıdır.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R65: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S3: Serin yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 FAX: 0232 864 13 34

AGRI SCIENCES

TARIMI ve İLAÇ ÜR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. No:31

Torbalı-İZMİR

Yatırım Sığ. Sic. No: 27000000000000000000

- ilaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- ilaç her türü ilaçlama aletiyle yerden atılabilir.
- ilaç zararlıya temasını sağlayabilmek için yapıların alt yüzeyleri de dahil olmak üzere ilacın iyi bir kaplama yapacak şekilde püskürtülmesi şarttır.

Uygulama Zamanı:

Bağ salkım güvesi: Salkım güvesi'ne karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C'yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dönemde 120 gd (gün/derece), 2. dönemde 520 gd, 3. dönemde 1047 gd'ye ulaşması, fenolojik olarak, 1.dölede çiçek tomurcuğu, 2. dölede koruk, 3. dölede tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde ilaçlama yapılır. Her döle bir ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Excaltence adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Excaltence'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISIBILİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç biinen insektisit ve fungusitlerin çoğuyla karıştırılarak kullanılabilir.



EXCALENCE

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 200 g
Esfenvalerate

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, gözyaşı ve sümük salgılarının artması.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkar. İlaç bulaşmış vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıka. Göze değmişse, en az 15 dakika bol suyla yıka. Doktor çağır. İlaç ambalajı ve etiketini birlikte götür.


ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

10 Temmuz 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



- S36/37:** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.
S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yertüsti sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LİD. Şİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

İZMİR
Hasan Tahsin V. Başkani
0232 864 175 8604 Tic Sic No 1*