

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI DOZU

#### KARDESLENMEDEDEN ÖNCE (2-4 YAPRAK)

Çeltik Darıcan - cinek (*Echinochloa crusgalli*) 75ml/da+ 75 ml/da  
yayıcı yapışınca

Çeltiksi darıcan (*Echinochloa oryzoides*)

#### KARDESLENMEDEDEN SONRA (1-2 KARDES)

Çeltik Darıcan - cinek (*Echinochloa crusgalli*) 100ml/da+100 ml/da  
yayıcı yapışınca

Çeltiksi darıcan (*Echinochloa oryzoides*)

Çeltik Su ayrığı (*Paspalum paspaloides*) 75ml/da+75 ml/da  
yayıcı yapışınca

#### KARDESLENMEDEDEN SONRA (5-7 KARDES)

Çeltik Baraj otu (*Diplachne fusca*) 150ml/da+ 150 ml/da  
yayıcı yapışınca

#### **KULLANMA ŞEKLİ:**

#### **İlaç Uygulamaya Hazırlama Şekli:**

İlaç önce ayrı bir kaptan az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır.

Dekara kullanılacak su miktarını tespit için önce aletin kalibrasyonu yapılır ve daha sonra ilaçlamaya geçilir. Bunun için önce aletin deposu su ile doldurulur. Tarla şartlarında çalıştırarak bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı hesap edilir. Daha sonra hesaplanan alan üzerinden gerekli miktar ilaç ilave edilerek hazırlanır ve ilaçlamaya geçilir.

#### **Uygulama Zamanı ve Şekli:**

Çeltikte darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı, çıkış sonrası, suyu boşaltılmış (çipil) tavalara pülverizatör ile uygulanır. İlaç tarlının her yerine aynı miktarda püskürtmek için dekara 25-50 litre su kullanılması tavsiye edilir. İlaç uygulandıktan sonra yabancı ot yüzeyinde kurumaması 4-5 saat içinde gerçekleşir. İlaç yabancı ot üzerinde kurduktan 4-5 saat sonra tavalara su verilebilir. Ancak tavalara su verme işlemi en geç 2 gün içinde yapılmalıdır. Su seviyesi mümkün olduğunca yüksek tutulup yabancı otların su altında kalması sağlanmalıdır.

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd.



# MYCORIX

Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 200 g Cyhalotop –butyl Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy) phenoxy] propionate

GRUBU	AI	HERBİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA

ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI

SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,

SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1

GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM EKİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI, N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER

Cyhalotop –butyl ve ksilen içerir.

N: Çevre için tehlikeli

#### RİSK İBARELERİ

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde

muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak

tutun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu

gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya

etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama

yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağız su ile yıkayın (sadece kişinin

bilinci yerinde ise).

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar No: 31

Torbalı/İZMİR

008 075 8601

23 Ocak 2012

Torbalı



Dr. Ahinç ARSLAN

Genel Müdür Yardımcısı

YILDIZ TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Mycorix adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Mycorix'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup A1 harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

**MYCORIX**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 200g Cyhalofop –butyl Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy] propionate

GRUBU	A1	HERBİSİT
-------	----	----------


**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

İlacın akut zehirliliği çok düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülen zehirlenme belirtilerine rastlanmaz. İlaç gözde tahriş yapabilir. Gerekliğinde zehir danışma merkezini arayınız.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

- Beklenmeyen Durumlarda:
  - \*Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın.
  - \*İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarın.
  - \*İlacın cilde bulaşması halinde bol su ve sabun ile yıkayın.
  - \*Yutulduğunda ilacın mideden tahliyesine doktor karar vermeli.
- ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:**
  - Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
YABUL EDİ MİŞTİR

23 Mart 2012

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- \*Tavsiye edilen dozlarda kültür bitkilerine fitotoksik değildir.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı orjinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orjinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orjinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancar Torbalı/İZMİR  
Torbalı V.D.066879 860

Torbalı V.D.066879 860