

KULLANILACAKI BİTKİLER

BİTKİ ADI	KULLANMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ	DOZU
SOPRALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	1.Uygulama: Çiçeklenmeden önce salkımlar henüz 4-8 cm boyda iken salkımları boyunu uzatmak amacı için kullanılır. 2.Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının %70-80'inin döktüğü devrede däne seyreltme için kullanılır. 3.Uygulama: Çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm. Sargın tiliğine ulaştığında däne irileştirmek için kullanılır.	100 ml/100 L su
KURUMALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi artırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml/100 L su
MANDARINLER	Sisuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede kullanılır.	75 ml/100 L su
PORTAKAL	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımını tanımlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağza kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.	100ml/100 L su
LİMON	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağzına 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml/100 L su
GREYFURT	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geçiktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır. Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin % 30'unun açtığı devrede verimi artırmak için kullanılır.	50 ml/100 L su 75-100 ml/100 L su
ARMUT	Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra parnemokarp meyve olusumunu sağlamak için kullanılır.	25-100 ml/100 L su
ERAZ ve VIŞNE	Hasadı geçiktirmek, iri ve parlak daneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır.	75 ml/100 L su
ŞEFTALİ	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geçiktirir ve şifahlırmı ilkbaharı geç donlardan zarar görmesini önler.	75 ml/100 L su
ÇİLEK	Fideliyelerde amçe bittinin verdiği genç sürgünlerin çoğaltılması için, amçe bittisi 1-6 yapraklı iken mahsulle yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveler inişletmek ve verimi artırmak için ise, çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.	75-125 ml/100 L su
ENGİNAR	Hasadı 1-2 ay öne almak, düğün seşili ve iri bas elde etmek amacı ile bittilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boydamın 20-30 cm olduğu devrede özelle bittilerin göbek kısmına kullanılır.	125-150 ml/100 L su
PATATES	Tohumluk patatesler dikilmeden önce GENO-GİBB 20 SL ile hazırlanan solusiyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çış sağlanır.	25-50 ml/100 L su
MARUL	Göbek bağlanmayı teşvik için hasatın 7-15 gün önce kullanılır.	50-100 ml/100 L su
BİBER	Verimi artırmak için çiçeklerin yanısı meyve tutuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.	150 ml/100 L su
SİS BİTKİLERİ	Kesme çiçekçilikte uzam sap ve iri çiçek elde etmek amacı ile krizantem, gül, sikkim ve karanfide uygular.	200-250 ml/100 L su

Son ilaçlama ile hasat arasında bekleme problemi yoktur.

3 2012

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



GENO - GİBB 20 SL

Suda Çözünen Konsantré (SL)
Aktif Maddelerin Adı ve Miktarı: 1 litrede 20 g Gibberellic Asit (GA3)
(S:3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-norbornene-2-oxo-pentahydro-4h,7-m-eltiano-9h,3-propanoate[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GRUBU	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
----	----

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EYDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel hiçbir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:


Hastayı kusturmayın. İlaçlı sıhadan uzaklaşın ve steril pedlerle Göze bulaşmışsa 10-15 dakika bol su ile yıkayın ve steril pedlerle kapayın.

Viteçde bulaşmışsa bulaştığı kısımları bol su ve sabunla yıkayın.

Hastayı sıcak tutun gerekirse doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidötü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÜRÜNLER ZEHİRLER DANIŞMANLIK MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ :

Xn: Zararlı

TEHLİKE SEMBOLÜ:



İÇİNDEKİLER:
GİBBERELİC ASİT VE DIETİLEN GLİKOL İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S:46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Bitki koruma ürününi ambalajından kapalı olarak muhafaza ediniz.

* Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

* Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanılmayın.

* Boşalan grda ve içecek kutularına bittisi konuma ürünü koymayın.

* Alev alabilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pançar, Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. / Pançar No: 31
Torbalı / İZMİR
Tic Sic No: 270805
5 8604

Geno-Gibb 20 SL, bunların dışında Muz, Karpuz, Lükana, Karnabahar, Bezelye, Fasulye, Soya, Patlıcan, Maydanoz, Kuşkonmaz, Havuç, Çay, Buğday ve Yonca gibi birçok bitkide de uygulanabilir.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaçtan aletin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç aynı bir temiz kapta birkaç litre su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır. Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Geno-Gibb 20 SL'ni aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplanı uygulama sayısını aşmıyoruz.

Uygulanma tekrarlamanın gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILIRLIK:

Geno-Gibb 20 SL, solüsyon serbesti klor ihtiva eden bileşikler dışında birçok ziraî mücadele ilacı ile birlikte kullanılabilir. Ancak yine de uygulamadan önce küçük miktarlarla ön karışım hazırlanarak deneme yapılması tavsiye edilir. Diğer ilaçlarla birlikte kullanılacaksa Geno-Gibb 20 SL ilaçlardan ayrı olarak hazırlanmalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



GENO - GİBB 20 SL

Suda Çözünen Konsantré (SL)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı (Litrede 20 g Gibberellin A-si (GA3))

(5S,3aR,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12 dihidroksy-3-methyl-6-methylene-2-oxopiperidro-4a,7-methano-9b,3-propanozalenol[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GRUBU — BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANICININ DİKKATİNE

Kullanma şeklinde belirtilen tavsiyeler genel tavsiyeler olup yöre için belirlenmiş bölge ve tavsiyelere uyulmalıdır.

Bu konuda en yakın tarım teşkilatı ile veya en yakın bölge büromuz ile temasa geçiniz.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç kuru ve serin yerde, kilitli alanda, orijinal ambalajında kapalı olarak +50 °C ile +23 °C arasında muhafaza edilmelidir. Bu depolama şartları altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile; imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez. İki yıl süreyle spesifikasyona uygunluğunu garanti eder.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pancur, Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ
Bekir Saydam Cad. Pancur No: 31
Torbalı/İZMİR
Torbali V.D.: 009 025 8504

3 Ocak 2012

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLENDİRME VE KAYIT BÖLÜMÜ

Genel Müdür Yardımcısı