

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

#### ÖZELLİKLERİ:

Flazon meyve, sebze ve süs bitkilerinde görülen zararlılara karşı yapıklara pişkinleştirilerek uygulanan, kontakt etkili bir insektisit-akarisitir. Zararlıların ilk gördüğü anda ve iyi bir kaplama yapılarak uygulamaya başlanır. Gerektiğinde tekrarlanabilir. Sulama yoluyla uygulanmaz. Uçakla uygulanmaz.

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
NARENCİYE	Pas böcüsü ( <i>Phyllocoptruta oleivora</i> )	25 ml/100L su	7 gün
DOMATES	Yaprak galeri güvesi ( <i>Phyllocnistis citrella</i> ) Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	25 ml/100L su 25 ml/da	3 gün
SÜS BİTKİLERİ	Galeri sineği ( <i>Lyrionomyza trifolii</i> )	25 ml/100L su	-
PAMUK	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	50 ml/da	2 gün
BİBER (Sera)	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	25 ml/100 L su	3 gün
HIYAR (Sera)	Kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	25 ml/100 L su	3 gün
ÇİLEK	İki noktalı kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	25 ml/100 L su	3 gün
PATLİCAN (Sera)	İki noktalı kırmızı örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	25 ml/100 L su	3 gün

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

FLAZON

Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 18 g Abamectin

Abamectin: % 80 Avermectin B<sub>1a</sub> + Avermectin A<sub>1a</sub> (5-0-demethyl) ve % 20 Avermectin B<sub>1b</sub> + Avermectin A<sub>1a</sub> (5-0-demethyl-25-dec(1-methylpropyl)-25-(1-methyllethyl))

GRUBU	İNSEKTİSİT- AKARİSİT
6	

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

19 Haziran 2014


GIDA TARIMI VE HAYVANCIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T: Toksik N:Çevre için tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T: Toksik N:Çevre için tehlikeli

#### İNDEKİLER:

Abamectin ve ksilen içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE

#### AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20: Solunması halinde zararlıdır.

R21: Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R25: Yutulması halinde toksiktir.

R38: Ciddi tahriş eder.

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 9: Kabi çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda köpük, karbondioksit, yangın söndürme tozu kullanınız.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar-Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN ve TİC.LTD.ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad/Pancar No:31  
Torbali/İZMİR

Tic Sic No: 27884  
Etilik No: 3749

Dr. Yusuf AYRAM  
Date: Başkani

**KULLANMA ŞEKLİ:**

**İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:**  
İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Aynı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma tertibatı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. İlaçlama esnasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.

**Uygulama Zamanı:**

**Narenciye:** İlaçlama Pas bücüsü görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10-20 litre mayı yeterlidir. %0.25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir.

**Galeri güvesi için;** taze sürgünlerde bulaşma tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanıp, yeni bulaşmalara göre 10-15 gün ara ile tekrarlanır.

**Süs bitkileri:** İlik Galeri sineği belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

**Biber ve Pamuk:** Yaprak başına ortalama 1-3 adet canlı Kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

**Domates, Hyar ve Patlıcan:** Yaprak başına ortalama 1-3 adet Kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.


**Çilek:** Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 10 veya üzerinde Kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlamaya karar verilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Flazon adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisit/ akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Flazon'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Diğer ilaçlarla karışımı daha önceden denenmemiştir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaça karşı oluşacak mukavemet nedeni ile farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir.



**Dr. Yunus BAYRAM**  
Daire Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**FLAZON**

Emülsiyon konsantre (BC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 18 g Abamectin

Abamectin: % 80 Avermectin B<sub>1a</sub> + Avermectin A<sub>1a</sub> (5-O-demethyl) ve % 20 Avermectin B<sub>1b</sub> + Avermectin A<sub>1a</sub> (5-O-demethyl)-25- de(-1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)

<b>GRUBU</b>	<b>6</b>	<b>İNSEKTİSİT- AKARİSİT</b>
--------------	----------	-----------------------------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Göz bebeklerinde büyüme adaleterde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Göz ile teması halinde:** En az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız ve tıbbi önlem alınır.

**Deri ile teması halinde:** İlaça bulaşık elbiseleri çıkarınız ve temas eden kısımları sabun ve suyla yıkayınız.

**Soluması halinde:** Hastayı temiz havaya çıkarınız. Gerekirse suni teneffüs yapınız.

**Yutulması halinde:** Fazla miktarda ilaç alınması halinde hastaya 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hasta kendinde değilse kusturmaya çalışmayınız.

**ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. B1 GABA aktivitesini hızlandıracığı için Barbiturat, Benzodiazepin, Valproic acid türü ilaçlar verilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

19 Haziran 2014

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S56:** Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

**S64:** Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

\*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

\*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

\*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

\*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

\*Arlara zehirlidir

\*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

\*Balıklar için zehirlidir.

\*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

\*İlaç yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gardardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad.Pancar No:31  
Torbali/İZMİR

111 Tahsin V.D. 008 of 3-ŞEBİR-İz. 52-NO-3749