

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

ÖNEMLİDİR:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Sphinx buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

BİTKİ	KONTROL EDİLEN YABANCI OTLAR	DOZ
BUĞDAY ve ARPA	Arap baklası (<i>Vaccaria pyramidata</i>)	1 gram/da
	Balıbbaba (<i>Lamium</i> sp.)	
	Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)	
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)	
	Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)	
	Sarı ot (<i>Boreava orientalis</i>)	
	Sedef otu (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
	Sinek kapan (<i>Silene copolidea</i>)	
	Yabancı cam çiçeği (<i>Geranium tuberosum</i>)	
	Yabancı çivit otu (<i>Isatis tinctoria</i>)	
	Yabancı fiğ (<i>Vicia</i> spp.)	
	Yabancı turp (<i>Raphanus</i> sp.)	
Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
Boynuzlu yoğurt otu (<i>Galium tricomutum</i>)		
Tarla yapışkan otu (<i>Asperula arvensis</i>)		
Topluluğne hardalı (<i>Neslia paniculata</i>)		
Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>)		

1.5 gram/da veya
1 gram/da+%0.1
Yayıcı Yapıştırıcı

11 Eylül 2015

GIDA TALEH VE İZMİR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yayıcı Yapıştırıcı

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Dağılabilen Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %75 Tribenuron-methyl

Methyl 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbonylsulfamoyl]benzoate

GRUBU	B	HERBİSİT
-------	---	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:



Xi: TAHRİŞ EDİCİ N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

Tribenuron-methyl içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temastan hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24: Cilt ile temastan sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHİ ve İLAÇ ÜR SAN ve TIC LTD ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbali/İZMİR

Dr. Ananur HAS

Genel Bilgiler:

Sphinx kökleri ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölümler belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar **Sphinx**'in etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. **Sphinx** uçuşu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:

Gerekli miktardaki **Sphinx**'i karıştırıcıya çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatu için gereklidir. Tatbikat için hazırlanmış **Sphinx** karışımlarını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz.

Uygulama Zamanı:

Hububatın iki yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. **Sphinx** tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otların az iki yapraklı devrede iken ancak, 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş'ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

Buğday ve arpadaki **Sphinx** kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.

NOT: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden **Sphinx**'i anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

FITOTOKSİTE:

Sphinx tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Sphinx adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Sphinx**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



SPHINX

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %75 Tribenuron-methyl

Methyl 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoate

GRUBU	B	HERBİSİT
--------------	----------	-----------------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bilinen bir zehirlenme belirtisi yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması Halinde: Kazazedenin bilinci açık ise; ağız suyla çalkalayınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Tıbbi bakım alınız.

Gözle Teması Halinde: Kontak lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Deriyle Teması Durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Solumması Halinde: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Doktora danışınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



14 Ekim 2015

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

İlaçlama Aletlerinin Temizlenmesi:

Tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinde zarar meydana gelebileceğinden hububatki ilaçlamalardan hemen sonra ilaçlama aletlerinin tüm parçalarını;

*100 litre suya 1 litre çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) hesabıyla hazırlanan eriyikle temizleyiniz.

*Bu eriyik 10 dakika süreyle karıştırıcı çalışmakta olan ilaçlama tankının içinde tutulur.

* İlaçlama tankı, pompası hortum ve borusu ilaçlama meme ve süzgeçlerini çıkardıktan sonra hazırlanan eriyikle en az üç defa temizlenir.

*Meme ve süzgeçler ayrı olarak yıkanmalıdır.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad.Pancar / No:31

Torbalı/İZMİR

Tic. Sic. No: 2799

Dr. Ali Akın HAS

Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.

Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlere tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Sphinx'i bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Sphinx hububatta; 2,4 Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Dağılabilen Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %75 Tribenuron-methyl

Methyl 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoate

GRUBU	B	HERBİSİT

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Yoktur.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR.SAN ve TIC.LTD.ŞTİ.

Bekir Saydam Cad.Pancar, No:31

Torbali/İZMİR

0232 864 13 33 0232 864 16 79

Dr. Alanın HAS

