

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BUĞDAY	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	50 ml/da	42 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulamaya Hazırlanması:
Reikon suspansiyon konsantre olan formülasyonu su ile kolayca karıştırılır. Önce kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar suda bulamaç haline getirilir. Daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür ve geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanmış ilaç karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır. Püskürtme sırasında karıştırmaya devam edilir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.

Dekara kullanılacak ilaç su miktarı belirlemek için, önce sadece su ile belirli alandaki bitkiler düzğünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaç su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulama Zamanı:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır. Şartlar hastalık için uygun giderse 10-14 gün arayla ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

Bitki Tahammülü:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında reikon ilacının tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Reikon adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup11;C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Reikon'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 11;C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

24 Mayıs 2014

Dr. Hüsnü BAYRAM
Başkan
Datışe Başkanı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Devamı 2. Sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

REIKON

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Litrede 200 g Azoxystrobin+ 80 g Cyproconazole methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate+(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-y)butan-2-ol (IUPAC)

GRUBU	11;C3	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: ZARARLI(Üreme sistemine toksik kat.3)

N:ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn: Zararlı

(Üreme sistemine toksik kat.3)

İçindekiler: Azoxystrobin ve Cyproconazole içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R 23 :Solunması halinde toksiktir..

R51/53 : Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R63 : Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. (Repr. Cat. 3)

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S 1/2 :Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 13 :Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 29 :Kanalizasyona boşaltmayın.

S 37 :Uygun eldiven giyin.

S 39 :Koruyucu gözlük / maske kullanın.

S 45 :Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiket gösterin).

S 46 :Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S63 : Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dindenmesini sağlayın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam / Celal Pancar No:31
Torbali/İZMİR

İhsan Tahsin / 098 475 8604 Tc. Sic. No:3749

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lto. Şti.



REIKON

Süspansiyon Konsantr (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Litrede 200 g Azoxystrobi+ 80 g Cyproconazole methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate+(2RS,3RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (IUPAC)

GRUBU	İİ;C3	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Önemli miktarda bünyeye alınması takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme durumunda doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç göze gelmişse; gözleri açık tutunuz ve hafifçe 15-20 dakika su ile yavaş yavaş durulayınız. Eğer mevcut ise ilk 5 dakikadan sonra kontaktlenleri çıkarınız, sonra gözleri durulamaya devam ediniz. Eğer yutulmuş ise hastanın ağzını su ile çalkalayınız. Hastayı kusturmayınız. Bilincini kaybetmiş kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

Deri ve giysilere bulaşmış ise; bulaşık giysiyi çıkarın. 15-20 dakika boyunca bol miktarda su ile cildi hemen yıkayınız. Tahriş devam ediyorsa tıbbi yardım isteyiniz.

Solumması halinde; hastayı temiz havaya taşıyınız. Solunum düzensiz ya da durmuş ise suni solunum yapınız. Hastayı ılık ve dinlendirici bir pozisyonda tutunuz. Tıbbi yardım isteyiniz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antitodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

21 Ağustos 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



KULANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCE

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LİM. Şİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar, No:31
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008/075 860 / Tif. S. 1