

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Sarı No :
Ruhsat tarih ve no :

GENEL BİLGİLER:

Kullanılması: Alphasave fraktörle çekilen pülverizatör ve sırt pülverizatörleri yada kaplama ilaçlama yapan ilaçlama aletleri ile kullanılabilir. Ev bahçelerinde kullanmayın. Haşareler ilk görüldüğünde tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Tütün (Fidelik döneminde)	Yaprak biti (Myzus persicae) Trips (Thrips tabaci) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	200 ml/da	21
Pamuk	Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)* Yaprak biti	350 ml/da	7
Şerbetçiotu	(Phorodon humuli)	100 ml/100 L su	14

* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

İLACIN HAZIRLAMASI VE UYGULANMASI:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ ye kadar su ile doldurun. Alphasave'i ayrı bir kapta az miktarda su içinde karıştırıp bu karışımı ilaçlama aleti tankına koyunuz. Daha sonra tankı su ile doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.

-Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Alphasave ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Alphasave herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Alphasave pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri Alphasave'in Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovist (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

-İlaçlamaya başlamadan önce bir dekar alanı ilaçlamak için gerekli olan su miktarını tesbit etmek için kalibrasyon yapılmalı, daha sonra ilaçlanacak alan için tesbit edilmiş gerekli miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karıştırılmalı ve bitkilerin her tarafı ıslanacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir.

- Bir sezonda aynı üründe aynı yerde Alphasave ile 2 defa fazla ilaçlama yapılmamalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.San. ve Tic. Ltd. Şti.



İlaç adı: ALPHASAVE

Insektisit (Böcek ilacı)

Suda Eriyebilir Sıvı (SL)

Etkil Madde: Litrede 200 g. Methomyl

S-methyl N-(methylcarbamoyl)oxy thioacetimidate

Sıcakda (dişi) akut oral LD₅₀: 30 mg/kg



ÇOK ZEHİRLİ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS ETMİYİNİZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVENİ VE GÖZLÜK KULLANINIZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLAMA SIRASINDA HIÇ BİRŞEY YEMEYİNİZ.
SİGARA İÇMEYİNİZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE 10 GÜN HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
ANTİDÖTÜ VE İLK YARDIM:
ATROPİN antitodur. Acil ihtiyaçlarda 0.5 mg Atropin tabletleri için doktorla danışın. Şüpheli zehirlenmelerde hangi şartlarda olursa olsun doktoru görün.
Eğer yutulmuşsa 1-2 bardak su için ve boğazın arka tarafına doğru parmakla veya bir şeyle dokunarak kusmayı sağlayınız. Hasta kinseye veya kusun kinseye ağzından bir şey veremeyin ve doktor çağırın. Teneffüs edilmemiş hastayı bu sahadan uzaklaştırın. Sirt üstü yatırarak sakın tutun. Hasta nefes almıyorsa suni teneffüs yapın, hastaya ağzından bir şey veremeyiniz. Şayet ikaz belirtileri görürseniz (ikaz belirtileri aşağıda verilmiştir) doktor gelmeden önce 2,5 tablet (her biri 0.5 mg) ATROPİN yutturulur. Bu işleme boğaz kuruyucuya kadar her 10-15 dakikada bir devam edilir. Doktor gelinceye kadar lüzumlu miktarda içirmeye devam edilir. İlacın göze bulması halinde göz kapığını açık tutarak hafif akan bir su ile 15 dakika boyunca yıkayınız. Deriyi bulamaştırma durumunda bol su ve sabunla yıkayınız ve gerekirse tıbbi müdahale yapınız.

DOKTORUN DİKKATİNE:
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Methomyl zehirlenmeleri anticholinesterase aktivite ile ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulantı görme, bulanık, bulantı, mide krampları, göğüs sıkışması, gazbebekelinin bütülmemesi, adale titremesi, terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler meydana getirir.

TEDAVİ: Tedavi için ATROPİN SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1,2-2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs veya oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer kolinsterez inhibitörlerinden biri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM kullanmayın.

Bununla beraber Alphasave ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPİN SÜLFAT tedavisini tamamlamayı

gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı :
Brüt ağırlığı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV'li) :
T.B Yazısının tarih ve No.su

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK ÖRİJİNAL VE KAPALI HUSUSLAR:

Alphasave ambalajında kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır. Normal (setin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Boş ilaç ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız. Boş ambalajları ya da ilaç fazlasını su kaynaklarından uzak bir yerde toprağa gömünüz yada usulüne göre imha ediniz.

İLAÇLAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ:

İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri arakak ilaçlama aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçler de dahil olmak üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere buluşturmuyunuz.

ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ:

Bal arılarına, kuşlara, balıklarına ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir. Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın. Akarsulara, göllere ve herhangi bir sularına sistemine buluşturmuyunuz.

ÖNEMLİ: Boş ambalajı tekrar kullanmayın, gömün ya da usulüne uygun imha edin. İlacı karıştırırken, tankta koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken ilaç buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise, gözlük ve maske kullanın. Her gün temiz elbise giyin. Kullandıktan sonra, yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın. Uygulama sırasında ve buluşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No: 31,

Pancart Belediyesi, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 21 39

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancart No:31
Torbalı-İZMİR

Torbalı Tel: 0232 864 21 39



Dr. Adnan ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.San. ve Tic. Ltd. Şti.



İlaç adı: **ALPHASAVE**

İnsektisit (Böcek İlaç)
Suda Eriyebilir Sıvı (SL)
Etkili Madde: Litrede 200 g. Methomyl
S-methyl N-((methylcarbamoyloxy) thioacetimidate
Sıçanda (diş) akut oral LD₅₀ 30 mg/kg

- Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması veya bu tür ilaçlara tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

KARİŞİBİLİRLİK:

Alphasave yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı, gıbi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel bir karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenirliliği küçük çapta bir karışım ile denemelidir. Karışım hazırlanırken önce Alphasave ilaçlama tankına konulmalıdır.


ALICININ DİKKATİNE- FİRMA BEYANI:

Firma bu ilacın etiketindeki kimyevi maddeye uygunluğu ve normal kullanıma şartlarında tavsiyelere göre kullanıldığında etikette yer almış kullanıma gavesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki, bunlar Firmamızın kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Firma hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. AGRI SCIENCES BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VERMEZ.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No: 31,
Pancar Beldesi, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 21 39

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı-İZMİR
Torbalı V.D. 0232 864 21 39



Dr. Ahmet AŞKIN
Genel Müdür Yardımcısı

(Handwritten signature)