



NESTOR 20 SP

İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
SUDA ERİYEİLİR TOZ (SP)

%20 Acetamiprid

(E) - N¹[(6-chloro-3-pyridyl) methyl]-N²-cyano-N¹-methylacetamidine

Siçanlara akut oral LD₅₀: 146 mg/kg

ZEHIRLİ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFÜS
ETMEYİNİZ. MASKE KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN,
GÖZLÜK KULLANINIZ. İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇ
BİRŞEY YEMEYİNİZ. SİĞARA İÇMEYİNİZ. DERİ VE
GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHLLENME BELİRTİLERİ

Hareketlerde yavaşlık, adale kasılmaları, denge bozukluğu
solunum azalışı, gözyaşı ve sümük artışı vb.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Kazara ilaç yutulmuşsa hastayı kusturun ve acilen bir
doktora başvurun. Gözlere sıçramışsa 15 dakika bol su
ile yıkayın. Üzerine dökülmüş ise, ilaşı elbiseleri çıkarın
ve deriyi bol su ve sabunla yıkayın. İlaç buharı bilmiyerek
tenefüs ediliyorsa hastayı temiz havaya çıkartın ve
doktora başvurun.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHLR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



AGRI SCIENCES

AGRI SCIENCES

AGRI SCIENCES

AGRI SCIENCES

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj no :
Ruhsat Tarihi ve No.su :

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 g/da (larva, ergin)	-
	Yaprak biti (zenk) (<i>Aphis gossypii</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	-
	Yaprak piresi (<i>Empoasca spp.</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	-
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotera decemlineata</i>)	6 g/da (larva, ergin)	7 gün
Domates (Tartla)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/da (larva, ergin)	3 gün
Domates (Sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/100 L su (larva, ergin)	3 gün
Antepfıstığı	Yaprak psillası (<i>Agonosoma targui</i>)	20 g/100 L su (ergin, nimf)	7 gün
Elma	Yeşil yaprak biti (<i>Aphis pomi</i>)	20 g/100 L su (ergin, nimf)	14 gün
Karpuz	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da (ergin, nimf)	7 gün
Biber (Sera)	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/100 L su (ergin, nimf)	3 gün

Özellikleri: İlaç sistemik etkilidir. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ile 21 gün korur.

Uygulamaya Hazırlama Şekli: Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aynı bir kapla ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır ve ilaçlamaya geçilir.

Kullanma Şekli: İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmura yağarsa ilaçlama tekrarlmalıdır.

Kalibrasyon: İlaçlamaya başlamadan önce, kullanılan aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar aletin ilaçlandığı bulunmalı sonra bu alana takabül eden doz ile ilaşı su hazırlanmalıdır.

Karşıbaşıllık Durumu:

Alkali özellikler hariç diğer insektisit, fungusit ve yaprak gübreleri ile karşıbaşıllık uygulanabilir.

Net Miktarı:
Brüt Ağırlığı:

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

KULLANIRKEN ve DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Baklılara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- İlaçı serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlaçı kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç kuru ve serin yerde, kilit altında, orijinal ambalajında kapalı olarak +5°C ile +25°C arasında muhafaza edilmelidir. Bu depolama şartları altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile; imalatçı ilacın kalitesini garanti eder. İmalatçı ilacın hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ:

AGRI SCIENCES TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pancar Beldesi, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31

Torbalı-İZMİR

Torbalı V.D. 0698 075 8604