

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU VE DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SURE |
|-------------------|---|-----------------|--|
| ELMA | Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>) | 240 ml/100 L su | 14 gün |
| KABAKGİLLER HİYAR | Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | 200 ml/da | 14 gün |
| BAĞ | Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>) | 200 ml/100 L su | 7 gün |
| DOMATES (Sera) | Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) | 200 ml/100 L su | 7 gün |
| KAYISI | Yaprak delen (<i>Coryneum beijerinckii</i>) | 200 ml/100 L su | 56 gün |

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Bu formülasyon su ile kolayca karışır. Gerekli miktar ilaç önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Piskürtme sırasında karıştırmaya devam edilir.

Uygulama Zamanı:

- Elmada Karaleke'ye karşı:** 1. ilaçlama; çiçek gözleri kabardığında
 - ilaçlama; pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görtülünce)
 - ilaçlama; çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesine uygun olduğu koşullara göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.
- Kabakgillerde; Hiyarda Mildiyö:** İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtileri görtülmesiyle başlanır. 8-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

PREMEX

Süspansiyon Konsantr (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 450 g Chlorothalonil+100 g Carbendazim
Tetrachloroisophthalonitrile +methyl benzimidazol-2-yl-carbamate

| GRUBU | M5+BI | FUNGİSİT |
|-------|-------|----------|
|-------|-------|----------|

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114




30 Aralık 2014
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Devamı 2. sayfada

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T+:Çok Toksik N: Çevre için Tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T+:Çok Toksik

N: Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Chlorothalonil ve Carbendazim içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R26:Solunması halinde çok toksiktir.

R37:Solunum sistemini tahriş eder.

R40:Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R41:Gözde ciddi hasar riski.

R43:Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R46:Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R60:Doğurganlığı azaltabilir.

R61:Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR SAN VE TIC LTD ŞTİ.

Bekir Saydam Cad /Pancar/İzmir/31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 856 8104 Tlx. 0232 3740

Bağda Kurşunu küf: İlaçlamaya olunlaşmadan hemen önce başlanır ve 10-15 gün ara ile hastalığın seyrine göre devam edilir. *Botrytis*'e karşı etki şekli farklı diğer fungusitlerle dönüşümlü olarak bir program içinde kullanılmasına mukavim ırkların oluşumunu önler.

Domateste (sera) Mildiyö: İlk hastalık belirtileri görülmeye ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile ilaçlamalar sürdürülür.

Kayısıda Yaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem), 2. ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde (normal dönem), 3. ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Premex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M5+B1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Premex'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M5+B1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Premex, yaygın olarak kullanılan WP formülasyonunda birçok insektisit ve fungusit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak karıştırılacak ilaç etketi üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Az miktarlarla bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygulanmasının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmalıdır, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışım bekletilmeden uygulanmalıdır. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkallerle karıştırılmamalıdır.



PREMEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 450 g Chlorothalonil+100 g Carabendazim
Tetrachloroisophthalonitrile + methyl benzimidazol-2-yl-carbamate

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| GRUBU | M5+B1 | FUNGİSİT |
|--------------|--------------|-----------------|

TEDBİRLER VE ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Akut ve subakut oral ve dermal toksisitesi düşük olmasına rağmen, uygulama sırasında normal koruma tedbirlerine dikkat edilmelidir. Göz ve vücudun çıplak kısımlarına ilacın sıçramasına dikkat ediniz. Acil durumlarda doktora başvurulmalıdır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın, derhal doktor çağırın, ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürün.

Deri ile temasında: İlaç ile temas etmiş kısımlar derhal bol su ve sabunla yıkanır. İlaç ile kirlenmiş giysiler derhal çıkarılır ve tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Tahrişlerin tedavisinde antihistaminikler veya steroidler kullanılması tavsiye edilir.

Göz ile temasında: Göz derhal açık olarak bol su ile en az 15 dakika yıkanır ve derhal ilaç etketiyle doktora başvurulur.

Yutulması halinde: Eğer hastanın bilinci yerinde ise derhal su verilerek kusturulur ve derhal doktora başvurulur. Akciğerlere kaçmasına dikkat edilerek mide yıkanır. Kullanılan şişe veya ambalajın etiketini doktora gösterilir.

ANTİDODU VE GEREKELİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHIR ÖNİŞMAMERKEZİ (ÜZEM) Tel:114

30 Aralık 2014
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

S4: Yerleşim alanlarından uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29/35: Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S53: Maruziyetten sakının, kullanılmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık yerinde bertaraf edin/ ettirin.

S63: Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHA VE İLAÇ ÜR.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. /Pancar/ No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 009-079-8604 TİC.Sic.No:3749

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



PREMEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 450 g
Chlorothalonil+100 g Carabendazim
Tetrachloroisophthalonitrile +methyl benzimidazol-2-yl-carbamate

| | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| GRUBU | M5+B1 | FUNGİSİT |
|--------------|--------------|-----------------|

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Anlara zehirlidir
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.


ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHA ve İLAÇ ÜR SAN ve TİC LTD ŞTİ.
Bekir Saydam Cad No:31
Torbalı/İZMİR
Tic Sic No: 275453
Vergi No: 31749

Hasan Tahsin V D 003175453 Tic Sic No: 31749



3.0.2014
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR