

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Bağ	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml /100 L su	21 gün
Domates	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml /100 L su	3 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	50 ml /100 L su	14 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Tiganex su ile kolayca karıştırılır. İlacı önce ayrı bir kaptaki az miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İy bir kaplama yapılımasına dikkat edilmeli, özellikle bağda salkımların ilaçla iyice ıslanması sağlanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlama Zamanı:

Bağda kurşuni küfe karşı: İlaçlamaya danelere su yürüdüğünde başlan ve 10-15 gün ara ile hastalığın seyrine göre devam edilir. Botrytis'e etkili, etki şekli farklı diğer fungusitlerle dönüşümü olarak bir program içinde kullanılması, mukavimliklerin oluşumunu engeller.

Dr. Mehmet Akın
Aralık 2011

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti



TIGANEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 300 g Pyrimethanil N-(4,6-dimethyl pyrimidin-2-yl) aniline

GRUBU	9; D1	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EYDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İNSAN VE HAYVAN GİRMESİNDE SINIRLAMA YOKTUR
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
GIDA TARIM VE HAYTARCIKLIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktar :

Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ
N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
TEHLİKE SEMBOLÜ



N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
İÇİNDEKİLER:
PYRİMETHANİL İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI
R51: Sıcak ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R53: Sıcak ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31
Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD.
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbalı-İZMİR
Tic. Sic. No: 008075

2. sayfa

Elmada karalekeye karşı:

- Birinci ilaçlama çiçek gözleri kabardığı dönemde
- İkinci ilaçlama pembe tomurcuk döneminde
- Üçüncü ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde yapılmalıdır.
- Dördüncü ve diğer ilaçlamalar hava koşullarına göre 10-14 gün ara ile yapılmalıdır.

Domatiste kurşunu küfe karşı:

İlaçlamalara hastalık görülür görülmez başlanır ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün ara ile devam edilir. İlaçlamayı iyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde uygulayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Tiganex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9;D1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Tiganex**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9;D1 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Tiganex alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılarak kullanılamaz.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti



TIGANEX

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Laitrede 300 g Pyrimethanil
N-(4,6-dimethyl pyrimidin-2-yl) aniline

GRUBU	9; D1	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve mukozayı tahriş eder. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, metahemoglobinaya bağlı cyanosis'e neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız, hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız.

Deriye teması halinde: İlaçla temas eden kısımları su ve sabunla yıkayınız.

Göze teması halinde: Göz kapakları açık olarak, temiz akan su altında en az 15 dakika yıkayınız. Belirtilerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz.

Yutulması halinde: Hasta kendinde ise kusturunuz. Suni teneffüs yapınız. Belirtilerin devam etmesi halinde derhal doktora başvurunuz. İlaçın etiketini veya ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methtylene blue kullanınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

DR. ALİ İZZET ÖZGÜR
2011 GIDA VE İLAÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA VE İLAÇ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- * Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- * Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- * Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- * Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- * Bahçeler için zehirlidir.
- * Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz.
İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanı. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31
Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Panos. No: 3.
Torbalı/İZMİR
Tic. Sic. No: 2708075 860.