

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

#### KULLANILACAK İTİTKİ VE YABANCI OTLAR

| BİTKİ ADI | YABANCI OTLAR                                                                                                                                               | DOZU                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BUĞDAY    | Yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i><br><i>A. ludoviciana</i> )<br>Delice ( <i>Lolium perenne</i> )<br>Kuş yemi ( <i>Phalaris</i><br><i>brachystachys</i> ) | 120 ml/da Tricam+100 ml<br>yayıcı ve yapıştırıcı |
| ARPA      | Yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> ve<br><i>A. ludoviciana</i> )                                                                                          | 120 ml/da Tricam+100 ml<br>yayıcı-yapıştırıcı    |

**DİKKAT: Tricam** yayıcı-yapıştırıcı ile birlikte karışım yapılarak kullanılır. TAVSİYE EDİLEN KARIŞIMLARA KESİNLİKLE UYULMALIDIR.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

##### İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:

**Tricam** ve yayıcı -yapıştırıcının iyi karışabilmesi için aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Yarıya kadar su doldurulmuş depoya bir depo için gerekli olan miktar **Tricam** ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır ve ilave edilir, daha sonra yayıcı-yapıştırıcı ilave edilerek tekrar karıştırılır. Bundan sonra karıştırmaya devam edilerek deponun geri kalan yarısı suyla doldurulur. İlaçlama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (Tee-jet) meme ile 3 atmosfer basınçla yapılır. Dekara yer aletleriyle 20-40 litre su kullanılır. İlaçlama rüzgarsız havada çiğ kalktıktan sonra yapılır. **Tricam** uygulandıktan 1 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

##### Uygulama Zamanı:

**Buğday, Arpa:** Yabani yulaf ve Delice'ye 2-3 yapraklı dönemden kardeşlenmenin sonuna kadar; Kuş yemi için 2-3 yapraklı dönemden kardeşlenme başlangıcına kadar.

**Tricam** çıkış sonrası (post emergens) uygulanır. **Tricam** uygulandıktan sonra yabancı otların yaprakları tarafından hemen alınıp, yabancı otların büyüme noktalarına taşınır. Dolayısıyla **Tricam** yabancı otların büyüme noktalarını tahrip ederek etki eder, ilaçlamadan sonra yabancı otların gelişmeleri hemen durur. Yapraklar 2-3 hafta içinde önce sarı kırmızı renge dönüşür ve daha sonra yabancı otlar tamamen ölürler. Ancak uygulama sırasında yabancı otların hızlı gelişme içerisinde olmaları gerekir. **Tricam** yabancı otların yukarıda belirtilen ilaçlama için uygun gelişme-dönemlerinde ve hızlı gelişme göstergileri durumunda uygulandığında en iyi etkiyi verir.

Dr. Kadir MELAN  
Daire Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



## TRICAM

Süspansiyon Konsantre (SC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 250 g /l Tralkoxydim  
2-[1-(ethoxymino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone

| GRUBU | A, I | HERBİSİT |
|-------|------|----------|
|-------|------|----------|

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

05 Ocak 2016  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

**TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:**



Xn: ZARARLI

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

**İÇİNDEKİLER:**

Tralkoxydim içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

**R22:** Yutulması halinde zararlıdır.

**R51/53:** Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

**S1/2:** Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

**S9:** Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

**S13:** Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S56:** Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

**TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Bekir Saydam Cad. No:45

Torbalı-İZMİR

Hasan TSKR...

Dr. Alkanur HAS



**Tricam** yapraklardan alındığı için ilaçlama sırasında kaplamanın iyi yapılması gerekir.

Yabancı otlar, ilaçlama için uygun ilaçlama dönemlerinde olmalarına rağmen kuraklık (susuzluk) veya tarlada aşırı su birikmesi veya çok soğuk (don) gibi nedenlerle gelişmeleri yavaşlayıp strese girmişler ise ilacı yeteri kadar almazlar. Böyle durumlarda **Tricam** bitkiler stresten kurtulduktan sonra uygulanmalıdır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**Tricam** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A, 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Tricam**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup A, 1 harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

**Tricam** geniş yapraklı birçok yabancı ot ilaçları ile karışım yapılarak kullanılmaz. 2.4 D amin (amin tuzları dahil) veya esterli ilaçlar ise **Tricam**'dan 5 gün önce veya sonra sulfanilüre grubu ilaçlar ise **Tricam**'dan 3 hafta önce veya 1 hafta sonra uygulanır.

*[Signature]*  
Dr. Kadri MELAN  
Daire Başkanı



## TRICAM

### Süspansiyon Konsantre (SC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 250 g / l Tralkoxydim  
2-[1-(ethoxymino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex -  
2-enone

| GRUBU | A, 1 | HERBİSİT |
|-------|------|----------|
|-------|------|----------|

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlacın bütününe alınması halinde bulantı ve kusma ile merkezi sinir sistemi (CNS) depresyonu görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Eğer göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak gayet yavaş akan suyla 10-15 dakika süre ile yıkayınız.

Eğer ilaç yutulmuş ise hastayı kusturmayınız.

Gerektiğinde hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

#### ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız. Aksi belirtilmedikçe solunum azaltıcı maddelerden sakınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

05 Ocak 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

#### FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar,Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

### AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR SAN ve TİC LTD ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancar No:45  
Torbalı/İZMİR

Hesap Tahsin V.D. 008 075 8604 Tic Sic No:3749

Dr. Alanur HAS