

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAK İBİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OTLAR	DOZU	DÖNEMİ
	Darıcan (Çinek) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Kız otu (Afacan) (<i>Cyperus difformis</i>) Kurbaga kaşığı (<i>Alisma plantago</i>) Güvercin ayağı (<i>Ammannia baccifera</i>) Kandıra (Deniz sandelye sazi) (<i>Scirpus maritimus</i>)	80 ml/da 100 ml/da	Kardesleşmeden önce 2-4 yapraklı dönemden-kardesleşme sonrası (1-3 kardeşli) döneme kadar

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki **Heroxa**'yı bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

Uygulama Zamanı:

Heroxa çeltik ekili alanlarında sorun olan yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılır. Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminden 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile suyu boşaltılmış (çipil) tavalara püskürtülerek uygulanır. İlacın çeltik tavaasının her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tam olarak kaplanmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama yelpaze huzmeli meme ile ve 3 atmosfer basınçla dekara 20-40 litre su kullanılarak yapılır. Tavsiye dozunun aşılmasına dikkat edilmelidir.

Uygulanmayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat (2 gün) içinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Eğer su vermede sıkıntı var ise bu süre en fazla 52 saat (3 gün) kadar uzayabilir.

Dr. Kadir MELAN
Daire Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Yağda dağılabilen (OD)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 25.2 g /1 Penoxsulam 3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

GRUBU	B, 2	HERBİSİT
-------	------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

05 Ocak 2016
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:



N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ İÇİNDEKİLER:
Penoxsulam içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* **Heroxa**, tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında çeltik bitkisine emniyetlidir.

*Sistemik etkili ot ilacı olup yabancı otların yeşil aksamından almır.

* **Heroxa**, hava sıcaklığına bağlı olarak 10 gün içinde etkisini gösterir. İlaç alan yabancı otlar sararmaya daha sonra kurumaya başlar. 10. günden sonra sümüksü bir hal alan otlar tamamen ortadan kaybolur.

*Çeltik tarımında yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tavsiye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. İyi ekti için tesviyenin düzgün yapılması ve ilaçlamadan sonra en geç 48 saat içerisinde tavalara su verilmesi gerekir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:45

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 075 8604 Tic Sic No: 2749

Dr. Alanur HAS

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Heroxa adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Heroxa**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Eğer çeltik tarlanızda Su ayrığı (*P. paspaloides*) ve Baraj otu (*D. fuscus*) gibi yabancı otlar var ise Cyhalafop-butyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer çeltik ilaçları ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



HEROXA

Yağda dağılabilen (OD)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 25.2 g /l Penoxsulam 3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxyl[1,2,4]triazolol[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

GRUBU	B, 2	HERBİSİT
-------	------	----------

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Göz ve cilt ile temas halinde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerine değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Gecikmeden bir göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde:

Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.

Soluması halinde: hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

05 Ocak 2016
GIDA İKİMİ VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

C. Melan

Dr. Kadir MELAN
Daire Başkanı

*İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.

*Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze huzmeli meneler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

*Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

*Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz. Aksi takdirde komşu bitkilere zarar verebilirsiniz.

*Uygulamadan iki saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

*İlaç kuşlara, balıklara, arılara ve toprak solucanlarına zehirli değildir.

*Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.

*Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız. Boşalan ilaç ambalajlarını yasalarda öngörülen tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ:

ilaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu güvenli bir şekilde tamamen boşaltınız. Deposunu ve tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Alet karıştırıcısını ve püskürtme mekanizmasını çalıştırarak, boruların, filtrelerin ve memelerin temizlenmesini sağlayınız. Dışını su ile durulayınız. Aynı işlemleri temiz suyla da tekrar ederek, aletin iyice durulanmasını sağlayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız, yıkama suyunu ve ilaçlama artıklarını kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak grdardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:45

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 075 8604 Tic. Sic. No: 27 76

Dr. Alihanur HAS