

KULLANIM TALİMATI VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON UYGULAMA İZİNİ VEREN ZEMİN DURUMU
Kahve ağaçları (Kahve)	<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>	15 g / 100 L su	3 gün
Bağ	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	10 g / 100 L su	14 gün
Elma	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	15 g / 100 L su	14 gün
Turuncgöl	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	20 g / 100 L su	28 gün
Çetlik	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	20 g / 100 L su	35 gün
Karpuz	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	20 g / 100 L su	3 gün
Kayısı	<i>Phylloxera</i> , <i>Phylloxera</i>	17.5 g / l	14 gün

KULLANIM TALİMATI

Bağcıların dikkatle okunması ve uygulanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

1. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.
2. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.
3. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ürünün kullanılması için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.



RAPIDOX 50 WG

Suda Dağılımlı Granül (WG)

Aktif Maddelerin Adı ve Miktarı: %50 Trifloksystrobin metil (E)-metiloksipropil (E)-metiloksipropil

GRUBU	11	FUNGİSTİ
-------	----	----------

ÖNCE OKUYUNUZ

EVDİ KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BÜHARINI VE YAĞA ZURRİLLERİNİ SÖLÜMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DUVEN, GÜZEL KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA İKİBİR ŞEY YEMİYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2 SAAT SİRE BU İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

FAVSAZ EDİLENE ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMAMIŞ ÜRÜNLERİ YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda belirtilen bir zehirlenme belirtisi gözlemlenmemiştir.

İLK YARDIMI ÖNLEMLERİ:

Zehirlenmeden şüphelenildiğinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Zehirlenmeden şüphelenildiğinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Zehirlenmeden şüphelenildiğinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

İnsan ve hayvan sağlığına zararlı etkileri yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31, Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31, Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31, Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Net Miktar:

Azami Perakende Satış Fiyatı

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Net İçerik: N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Net İçerik: N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Trifloksystrobin içeriği.

UYGULAMA VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İZLENİMLERİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Çift ile temasında hassas bitki türlerine zararlıdır.

R50: Sıvı veya katı ortama uzun süreli etkilerinden dolayı zararlıdır.

R53: Sıvı veya katı ortama uzun süreli etkilerinden dolayı zararlıdır.

Özellikler:

GÜVENLİK İZLENİMLERİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Çift ile temasında hassas bitki türlerine zararlıdır.

S4/3: Yıyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S24: Çift ile temasından sakının.

S29: Kamalyazıya atılmamalıdır.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi kullanınız.

S40: Yutulmuş halde hemen bir doktora başvurun. Kabu veya etkileri gözlemlenmelidir.

S50: Bu maddeli ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edilmelidir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pınar Bölgesi, Torbalı - İZMİR



RAPIDOX 50 WG

Suda Dağılabilen Gramül (WG)

Aktif Maddelerin Adı ve Miktarı: %50 Trifloxystrobin

methyl (1-(2-methoxyvinil)-1H-imidazol-5-yl)-1H-imidazol-5-ol/1-methyl-1H-imidazol-5-yl-1H-imidazol-5-ol

GRUBU	II	FUNGİSİT
-------	----	----------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

2.sayfa
Çiftlik yanlarında: Çevrede ilk basitlik belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır.
Kasallık belirtilerinin görülmesiyle 10-15. gün aralıklarla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Karpuza Erken yaprak yanıklığı: Çevrede ilk basitlik belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Kasallık belirtilerinin görülmesiyle 7-10. gün aralıklarla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kavayada Yaprak deleni: Yaprak deleni karşı 1. ilaçlama Sonbaharda yaprak dokumansız bemen sonra 2. ilaçlama Ekim ayında çöcek tomurukları çıktından önce pembe çiçek tomurukları çıktığında, 3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek oğum kütür meyvenin ortum sıvırdığı dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ ELİFAZOLİBİGLİ:

Rapidox 50 WG adı başka koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Group II olarak sınıflandırılmış bir fungisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip başka koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Rapidox 50 WG'ni aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

KARŞIYANLI İRİLEK DİRENÇİ:

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karşıyabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilir testi yapılmalıdır. Şayet Rapidox 50 WG diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkili olacaktır. İse aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karşıyabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilir testi yapılmalıdır. Şayet Rapidox 50 WG diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkili olacaktır. İse aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karşıyabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilir testi yapılmalıdır. Şayet Rapidox 50 WG diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkili olacaktır. İse aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karşıyabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilir testi yapılmalıdır. Şayet Rapidox 50 WG diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkili olacaktır. İse aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karşıyabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışılabilir testi yapılmalıdır. Şayet Rapidox 50 WG diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkili olacaktır. İse aynı yılın sezonun içerisinde önerilen toplam uygulamaya sınırlı uygulamayı uygulamadan tekrarlaması gerektiği dikkatlenmelidir. İse, farklı etki mekanizmasına sahip Group II başka bir başka koruma ürününün kullanılmasına özen gösterilmelidir.

27 Mayıs 2013

AGRI SCIENCES Tarım ve Hayv. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Bekar Saydam Cad. No: 31,
Pamuk Beldesi, Torbalı - İZMİR
Tel: 0332 864 13 33, Faks: 0332 864 16 74

BİTKİ TABİATINDA:

Tarımsal uygulamaların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için bitkilerin bitkilerle herhangi bir toksisiteye neden olmaz.

KULLANILAN VE DEPOLANAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

* Başlangıç ambalajları usulüne uygun olarak ambalaj ediniz.

* Başlangıç ambalajları başka amaç için kullanılmak üzere kullanılmayınız.

* Başlangıç gübre ve diğer ürünlerin bir arada kullanılması tavsiye edilmez.

* Baklıklar için zehirlidir.

* Yer altı ve yer üstü sularına bulaşımından kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

İlaç serin ve kuru yerlerde, kilit altında, orijinal ambalajında, ağız kapalı olarak depolanmalıdır. Yem ve gübre maddelerinden uzak yerlerde muhafaza ediniz -10°C'ın altında -35°C'ın üzerinde depolanmaz. İlaç, ilmal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolanmalıdır.

İzole ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı malatının kontrolden çıktığında, faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine karşılık, imalatçı ilacı uygun olmayan şartlarda depolanması veya kullandığı ve zamanında uygulamamasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve Hayv. Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Pamuk Beldesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0332 864 13 33, Faks: 0332 864 16 74

AGRI SCIENCES

TARIM VE HAYV. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Torbalı - İZMİR

Hüseyin Tahiroğlu

AGRI SCIENCES

TARIM VE HAYV. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekar Saydam Cad. No: 31,

Torbalı - İZMİR

Hüseyin Tahiroğlu