

İmza Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şağı No :
Rulenet Tarzı ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SURE
ELMA	Karaleke (<i>Venturia mesquitalis</i>)	200 ml/100 L su	3 gün
HIYAR	Miltiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/100 L su	3 gün
SEKER PANCARI	Yaprak ipeke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	300 ml/da	3 gün
DOMATES	Miltiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	175 ml/100 L su	3 gün
KAYISI	Yaprak gölen (<i>Coryzus bejerrickii</i>)	200 ml/100 L su (normal ve dormant dönem)	56 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
Uygulanmadan önce ilağı mahlütün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacı ambalajını mutlak bir kaç defa baş aşağı çevirdikten sonra, kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarımsa kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine döktülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

Kullanma Zamanı:

Elmada Karalekeye karşı:
1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında,
2. İlaçlama pembe rozet tohumluğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görülmeye),
3. İlaçlama çiçek (ağ yaprakları) %70-80 döktülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesine uygun olduğu koşullara göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Değerlendirme Sayısı:

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Bekir Saydam Cad. No:31 Pançev, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Stipsanسیون konsantre (SC)

Akdtf Maddesinin Adı ve Miktarı: Lircede 500 g Chlorothalonil
Tetrachloroisophthalonitrile

GRUBU	MS	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETKETİ OKUYUNUZ.
EYDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BÜHAR VE VEVEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAYSIYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTIMIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:14

19 Aralık 2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KATILIM ÖZEL MÜBESAN TALİSH

KABUL ELMİŞTİR.

Net Miktarı:
Azami Perakende Snuş Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

T: Çok toksik N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ:



T: Çok Toksik

N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Chlorothalonil içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RISK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R26: Soluması halinde çok toksiktir.

R37: Solumum sistemini tahriş eder.

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sıcucul organizmalar için çok toksik, sııcucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S4: Yerleşim alanlarından uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pançev, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. No:31 Pançev, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Hiyarda Mildiyö: İlk ilaçlamaya bitkiler; kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 8-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Şeker pancarında Yaprak leke hastalığı: Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele alınan erişkin yaprakların % 5 inde en az birer leke görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 15-20 gün araya hasattan 3-4 hafta öncesine kadar tekrarlanmalıdır.

Domates mildiyöüsü: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal ilaçlamaları başlanır. 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Kayısıda Yaprak öteli: İlk ilaçlama sonbaharda yaprak döktükten sonra (dormant dönem). 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurukları açılmadan önce, pembe çiçek tomurucu döneminde (normal dönem) yapılır. 3. ilaçlama meyvelerde yanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayıldığında dönemde yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Sprint adlı bitki koruma ürünü, ekti mekânınıza göre Grup M5olarak sınıflandırılmış bir fungisitür. Aynı ekti mekânınıza sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlama uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Sprint'in aynı üretim sezonun içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı ekti mekânınıza sahip (Grup M5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

Sprint yaygın olarak kullanılan WP olarak formüle edilmiş birçok insektisit, fungisit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileri üzerindeki tavsiye ve dozları dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkali ile karıştırılmamalıdır. Az miktarlarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımında ayrıtma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçları ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımın bekletilmeden uygulanmalıdır. Sulfektanlar ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Devlet 3. Sınıf
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Mühür Yabancı
Mühür Yabancı



Stipsansiyon konsantré (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 500 g Chloroizalonil
Tetrachloroisophthalatolitril

GRUBU	MS	FUNGİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlere tahriş edicidir. Deri ile temas halinde kızamıkçık, bronşlarda hafif tahriş şeklinde geçici alerjik yan etkiler görülebilir. Bu hafif geşici olup, kalıcı bir iz bırakmaz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktora başvuru, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götür. Eğer göze bulaşmışsa, hemen gözler açık olarak en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Doktora başvurunuz.

Çilde temas ederse ilacı buluşuk elbiseleri çıkarınız ve temas eden vücut kısımlarını bol ılık su ve sabunla yıkayınız. Tahriş veya hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Solumması durumunda hastaya temiz havaya çıkartarak rahat nefes almasını sağlayınız. Doktora başvurunuz.

Yutulması durumunda hastayı kusturmaya çalışmayınız. Derhal doktora başvurunuz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

19 Aralık 2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARŞILI EDİLMİŞTİR

S24: Çilt ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Çilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S33: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketini gösterin).

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerine bertaraf edin / ettirin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanılan talimatna/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

S63: Kazara solumması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
Torbali / İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 9087075 8604

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar; Torbalı-İZMİR

Tel: 02322.864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.




Süspansiyon konsantre (SC)

Akif Maddein Adı ve Miktarı: Litrede 500 g Clalorolalomi
Tetracloroisophthalonitril

GRUBU	MS	FUNGİSİT
-------	----	----------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



19 Aralık 2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR:

- *Btk'i koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kumlarına btk'i koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir.
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

***İLACI KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Seydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Seydam Cad. Pancar No: 31
Torbalı / İZMİR

Hasan Tahsin Y. 008 078 8604