

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ	Milidiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	50ml/100 L su	-
DOMATES	Geç yanıklık (Milidiyö) ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150 ml/100 L su	-
NARENCİYE	Alternaria yanıklık hastalığı ( <i>Alternaria alternata</i> f sp. <i>citrif</i> )	250 ml/100 L su	-

#### KULLANMA ŞEKLİ:

##### İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:

Ağfesin süspansiyon konsantre olan bu formülasyon su ile kolayca karışır. Önce kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar suda bulamaç haline getirilir. Daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür ve geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanmış ilaç karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır. Püskürtme sırasında karıştırmaya devam edilir. Yüksek sıcaklıklarda ve sıcak havalarda, yağmur beklenen günlerde, rüzgarlı havalarda ( hızı 15 km/saatten yüksek olduğunda) ilaçlama yapılmamalıdır. Karıştırmak için çelik sipreylene tankı kullanmayınız, plastik veya paslanmaz çelik tank kullanınız.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



# AGFESİN


Süspansiyon konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 65.82 g/L Metalik bakıra eşdeğer Bakır Sülfat pentahidrat

GRUBU	MI	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.  
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



06 Mart 2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Handwritten signature and initials.

Devamı 2. sayfada

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ  
TEHLİKE SEMBOLÜ



N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

#### İÇİNDEKİLER:

BAKIR SÜLFAT PENTAHİDRAT İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 61: Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancarı, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancarı, Torbalı-İZMİR

Torbalı 0232 864 16 79

Torbalı 0232 864 16 79

## 2. sayfa

**Bağ:** Bağ mildiyösüne karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Birinci ilaçlama, kışlık sportlarla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görülmeden) yapılır İkinci ve daha sonraki ilaçlamalar ilacın etki süresiyle günlük sıcaklık, yağış ortalaması, nispi nem ve çiğ gibi meteorolojik etkenler hastalık için uygun koşullar oluşturduğunda yapılmalıdır. Hastalık etkenleri ortadan kalktığıında ilaçlamalara son verilmelidir.

**Domates:** İlk hastalık belirtileri görüldüncce ilaçlamaya başlanır ve birer hafta ara ile ilaçlamalar sürdürülür.

**Narenciye:** Sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalara meyvenin yaklaşık 4 cm olduğu döneme kadar 10-11 gün ara ile devam edilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**Agfesin** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Agfesin'** in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup M1 hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞILIRLIK DURUMU:

**Agfesin** yüksek alkali reaksiyonlu pestisitlerle veya fenvalerate, parathion, chlorpyrifos ve dichloran ile karıştırmayınız.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L. Şti.



# AGFESİN

Süspansiyon konsantre (SC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 65.82 g/L Metalik bakıra eşdeğer Bakır Sülfat pentahidrat

GRUBU	M1	FUNGİSİT
-------	----	----------

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

**Agfesin** yutulduğunda, bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın, doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

**Deriye ile temasında:** İlaçla bulaşık giysileri derhal çıkarın. İlaç ile temas etmiş kısımlar bol su ve sabunla yıkayın.

**Göz ile temasında:** Göz derhal açık olarak bol su ile yıkayın. Derhal doktora başvurun.

**Teneffüs edilmesi halinde** hasta derhal ilaçlama alanından uzaklaştırılarak temiz havaya çıkarılır. Hastanın elbiseleri gevşetip dindirilir.

**Yutulması halinde:** Hastanın bilinci yerinde ise, parmağı boğazına sokarak veya ılık tuzlu su vererek hastayı kusturunuz. Bilinci yerinde değil ise kusturmaya çalışmayınız ve ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Semptomatik tedavi uygulanır. Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

06 Mart 2012

GIDA TAKİM ve BAYANCIKIR BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL ENLEMİŞTİR.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

\*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

\*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

\*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

\*Boşalan grda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

\*Balıklar için zehirlidir.

\*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

\*Arılar için zehirlidir.

\*Çiçekleme zamanı kullanmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

### FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79