

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

Dynam, elma ve armut ağaçlarında kullanılan bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında aşağıda belirtilen sonuçlar elde edilir.

- Tüm elma armut çeşitlerinde meyveler irileşir, ağırlık kazanır, standart boy ve şekilde meyveler oluşur daha fazla verim elde edilir.
- Daha çok meyve dalı oluşur, ağaçların şekli güzelleşir, meyve gözleri artar, daha fazla meyve elde edilir.
- Meyve tutumunu düzenler, meyve ağırlığını artırır, büyük ve iyi görünümlü kaliteli meyve oluşmasını sağlar.

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

BİTKİ ADI	BİTKİ ÇEŞİDİ	KULLANIM AMACI VE DÖNEMİ	DOZU
ELMA	Kırmızı çeşitler (Starling v.s.)	İri ve standart meyve için; Çiçeklenmenin %60-80'i tamamlandığında tek ilaçlama	60-100 ml/100 L su
ELMA	Sarı çeşitler (Golden delicious v.s.)	İri standart meyve, ince kabuklar için. 1. ilaçlama; taç yapraklar dökülmeye başlayınca, 2. ilaçlama; 1. ilaçlamadan 7 gün sonra, 3. ilaçlama; 2. ilaçlamadan 10 gün sonra.	60-100 ml/100 L su 60-100 ml/100 L su 60-100 ml/100 L su
ELMA	Sarı çeşitler (Golden delicious v.s.)	Paslanmaya karşı: 1. ilaçlama; tam çiçekte, 2. ilaçlama; petal (çiçek) yaprak dökünce, 3. ilaçlama; 2. ilaçlamadan 10 gün sonra	70 ml/100 L su
ELMA	Genç fidanlarda (Bütün çeşitler)	Ağaçların gelişmesi meyve dallarının büyümelerinin teşvik edilmesi ve ağaçların meyve veriminin çabuklaştırılması için, 1-2-3 yaşındaki ağaçlara erken ilkbaharda bir ilaçlama yapılır.	200 ml/100 L su
ARMUT	William ve diğer çeşitler	İri, standart şekil ve büyüklükte meyve için 1. ilaçlama, taç yapraklar dökülmeye başladığında; 2. ilaçlama 1. ilaçlamadan 7-10 gün sonra	60 ml/100 L su

10 Şubat 2018  
Mühür ve İmza Alanı

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Suda Çözünen Konsantre (SL)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

18.8 g/L 6-Benzyladenine + 18.5 g/L Gibberellin A4A7 (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxopenthydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazulenol[1,2-b]furan-4-carboxylic acid & 6-benzyladenineH(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxopenthydro-4a,7-methano-3,9b-propenoazulenol[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GRUBU	BGD
-	-

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE VEVEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

AGRI SCIENCES DYNAM  
TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KASUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :  
Azanmı Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xi:Tahrış Edici

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xi:Tahrış Edici

İÇİNDEKİLER:

Gibberellin A4 A7 ve Benzyladenine içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R36/38: Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2:Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S37:Uygun eldiven giyin.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S64:Yutulması halinde, ağız su ile yıkayın (sadece kişinin bilince yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Torbalı Zehir Danışma Merkezi  
Tel: 114

**KULLANMA ŞEKLİ:**

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:  
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Tavsiye edilen doz  
Dynam ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırıldıktan sonra aletin  
deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo  
doluncaya kadar su ilave edilir. İyi sonuç elde etmek için ağacın her yönünü  
iyice ıslatacak şekilde pülvize edilir.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Tek başına kullanılması önerilmektedir. Kimyasallarla tank karışımı yapılması  
durumunda alman sonuçlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.



# DYNAM

Suda Çözünen Konsantr (SL)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:****Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:**

18.8 g/L 6-Benzyladenine +18.5 g/L Gibberellin A4A7  
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-  
methylene-2-oxopiperidino-4a,7-methano-9b,3-  
propanoazulenol[1,2-b]furan-4-carboxylic acid & 6-  
benzyladenine+(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-  
methyl-6-methylene-2-oxopiperidino-4a,7-methano-3,9b-  
propanoazulenol[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

GRUBU	-	BGD

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Zehirli değildir. İnsanlarda zehirlenme vakası görülmemiştir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Yutulduğu takdirde zarar verebilir, bu durumda doktora  
müracaat edin. Göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayın,  
bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayın.


**ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

10 Şubat 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK****HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürününü koymayınız.
- \*Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- \*Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa Dynam'ın etkisini azaltabilir.
- \*En iyi etki için ilaçlama suyunun pH'sı 5-7 arasında olmalıdır.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

İlaç ve İlaç ÜR SAN VE TİC LTD ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

Tic. Sic. No: 270000 / Tic. Sic. No: 3749