

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SURE
BAĞ	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
	Ölü kol (<i>Phomopsis viticola</i>)	100 ml/100 L su	
KAYISI	Yaprak delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophytus</i>)	1. ilaçlama: 500 ml/100 L su 2. ilaçlama: 250 ml/100 L su 3. ilaçlama: 250 ml/100 L su	7 gün
	Kahverengi leke hastalığı (<i>Alternaria alternata f.sp.citri</i>)	200 ml/100 L su	7 gün
	Halkalı leke (<i>Spilotea oleagina</i>)	250 ml/100 L su	14 gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 ml/da	7 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

Ürünün Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaçlama aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde kaplama ilaçlama olarak ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Uygulama Zamanı:

Bağda Mildiyö: Sür-günler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 2 haftalık aralarda 3-4 kez tekrarlanır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lm. Şti.



LAMPRIIS

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 361,1 g/L Metalik Bakır'a eşdeğer Bakır Hidroksit

GRUBU	MI	FUNGİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



12 Nisan 2013

Dr. Nevzat ERİŞİK
Beynelkur Veridincisi

Devamı 2. sayfada

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ:



N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

BAKIR HİDROKSİT İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE

AÇIKLAMASI:

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan grda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yüzüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar, Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin D. 008 075 8664

Bağda Ötükol: Yaz ilaçlaması yapılıdır.

- 1.İlaçlama sürgünler 2-3 cm boyda iken,
- 2.İlaçlama sürgünler 8-10 cm boyda iken,
- 3.İlaçlama sürgünler 25- 30 cm boyda iken yapılır.

Kayıtsız Yaprak deleni:

- 1.İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem)
- 2.İlaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem)
3. İlaçlama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (Normal dönem)

Turunçgillerde Kahverengi leke hastalığı: İlkbaharda sürgünlerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10'ar gün ara ile tekrarlanır.

Domatesde Miltidyö: Belirtiler görüldüğünde başlanır. 10 ar gün ara ile tekrarlanarak iki kez uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Lampris adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Lampris**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILIRLILIK DURUMU:

Carbaryl terkipli ilaçlar hariç diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir. Her ihtimale karşı çiftçi şartlarında ön karışım denemesi yapılmalıdır.



LAMPRISS

Süspansiyon Konsantr (SC)

Aktif Maddein Adı ve Miktarı: 361,1 g/L Metalik Bakır'a eşdeğer Bakır Hidroksit

GRUBU	M1	FUNGİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme, anemi

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulduğu takdirde doktor çağırın. 1-2 bardak süt içirerek kusturmaya çalışın. Hastanın şuru yerinde değilse kusturmayın. Deriye temas eden yerleri bol su ve sabunla yıkayın. Göze kaçmışsa bol su ile yıkayın. Doktora ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

DEPOLAMA DURUMU:

İlaci orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbali / İZMİR

Hasan Tahsin

12 Nisan 2013

Sky
Sh Gül
Hasan Tahsin
Genel Müdür Yardımcısı